

INTERNACIA MEDICINA REVUO



Oficiala Organo
de
**TUTMONDA
ESPERANTISTA
KURACISTA ASOCIO**
(T. E. K. A.)

Monata ligilo
de la kuracistoj,
farmaciistoj, dentistoj
kaj aliaj medecin-
rilatantaj profesianoj.

11a Jaro

N-ro 4a

Aprilo 1933

ENHAVO

ORIGINALAJ ARTIKOLOJ

D-ro RIEDL (Praha). — Niaj rezultoj kun radiumaj kuraciloj	61
D-ro PUGMIRE (Londono). — Pri la etiologio de stomak-ulcero	62
D-ro HUKU-HARA-T (Niigata). — La normala movado de la maldika intesto	63

REFERATOJ

HIDEO SHINODA: Pri la korpa stato de la matura japana novnaskito. — LE-CORNU kaj PECKER: Toksigo per karbontetraklorido. — LUMIERE: Pri heredo-tuberkulozo. — DELATER: Novaj konoj pri patogenia meĥanismo de flebitoj, iliaj antaŭforiga kaj resanigakuracadoj. — SCHER-MANN: Aldono al terapio de pulma tuberkulozo. — PIOT: Ĉu radiologia diagnozo de abdomenaj algluaĵoj estas ebla? — MOUZON: Krudaj pomoj en la kuracado de diareoj. — RAHIER: La stomaka sekrecio ĉe la urtikario. — STEIMT: Pri iktero ĉe la diabetuloj. — MORHARDT: Ĉu endokrina; glandoj ludas rolon en la etiologio de reŭmatismo? — FRUITIER: Ĉu ekzistas familioj kies membroj estas emaj por esti trafitaj de difterio? — WALC kaj KLIMKIEWICZ: Pri kuracado de tetano per serumo. — DOMMESCENT: Resanigo ĉe du kazoj de grava tetanio. — KONIECPOLSKI: Pri malfrua aplikado de la kontraŭ-difteria sero. — PRIBAM: La patologia signifo de la sanganta mamo. — COURMONT kaj SEDAILLON: Epidemio de puerpura febro kaŭzata de unu sama streptokoko de laringa deveno	65
--	----

DIVERSAĴOJ

D-ro FAFNER. — Vegetarismo aŭ tradicia dieto?	73
Novajetoj	74
Pri la ecoj de la « ŝtono F. V. »	75
Fakvortara diskutejo. — Kuracistoj kaj loĝantaro	76
Leterkesto. — Nekrologo	77
Internacia komitato por esplorado kaj kontraŭbatalado de cirkuladaj perturboj. — Bruselaj Medicinaj Tagoj	78
Bibliografio	79
Medicinaj kongresoj	80

Adreso: 19, avenue Montjoie, Uccle 3 (Belgujo)

INTERNACIA MEDICINA REVUO

Internacia Medicina Revuo estante sendependa diskutejo, nek aprobas nek malaprobas la ideojn de siaj korespondantoj, kiuj sole respondas pri la opinioj esprimataj kun ilia subskribo.

La redakcio rezervas al si la rajton mallongigi la manuskriptojn kaj korekti ilin, sed nur laŭ lingva vidpunkto.

La senditaj tekstoj estu, se eble skribitaj *permaŝine*; almenaŭ ili estu *klare* skribitaj. Ne publikigati ili ne estas resendataj. La aŭtoroj de originalaj artikoloj ricevos laŭeble 25 represigojn de sia verko.

Reproduktoj kaj traduktoj estas nur permesataj kun *indiko de deveno*.

ABONOJ

Sin turni al la landaj kasistoj de T.E.K.A., aŭ senpere al la Administracio. Ĉiuj abonoj komenciĝas de la n-ro I *Ordinara eldono* kostas, por unu jaro, 7.20 belgojn (36 belg. frank.) *Lukŝa eldono*, sur baritpapero, estas rezervata al la subtenantaj membroj, kiuj pagas almenaŭ trioblan kotizon.

REDAKCIO KAJ ADMINISTRACIO

19, Avenue Montjoie, UCCLE 3 (Belgujo)

Poŝteĉkonto: Bruxelles n^o 2814.51. — Telefono 44.53.11.

HONORA PROTEKTANTARO

Belgujo: P-ro I. GUNZBURG. — *Ĉeĥoslovakujo*: P-roj KADLICKY kaj OSTRĚL. — *Danzigo*: P-ro PE-TRUSZKY. — *Francujo*: P-roj CALMETTE kaj RICHET. — *Germanujo*: P-roj H. STRAUSS kaj VIERORDT. — *Japanujo*: P-roj FUJINAMI, MOCHIZUKI, NISHI kaj OGATA. — *Polujo*: P-roj BUJWID kaj WRZOSEK. — *Sovetunio*: P-roj KABANOV, LYSENKOV kaj SCHERBAK.

ĈEFREDAKTORO : **Profesoro VANVERTS** (Lille).

KUNLABORANTARO

D-ro ALECHINSKY (Bruxelles); P-ro ASADA (Nagasaki); D-ro AUSTERLITZ (Bardejov, Ĉeĥoslovakujo); D-ro BABADAGLY (Kiev); D-ro BLASSBERG (Krakov); D-ro BOKARIUS (Harkovo); D-ro BORUCHOWICZ (Warszawa); S-ro BOUCON (Annecy); D-ro BOURG (Bruxelles); D-ro BRIQUET (Lille); D-ro BULYOVSKY (Kiskunmajsa, Hungarujo); P-ro CANUTO (Torino); P-ro CARBONE DOMENICO (Milano); D-ro CUGIO ARAI (Tokio); D-ro DROUET (Paris); D-ro FELS (Lwow); D-ro GOGITIDZE (Leningrad); D-ro GOLDBAUM (Lodz); D-ro JAGI (Kioto); D-ro KEMPENEERS (Bruxelles); D-ro KOLOMOJCEW (Tallinn); D-ro KRENICKI (Warszawa); D-ro KRYNSKI (Warszawa); D-ro KURMIS (Riga); D-ro LINK (Saint-Louis, Usono); D-ro MAEDER-LÖFFLER (St. Gallen); D-ro MAES-DUBOIS (Bruxelles); Farm. MAHOVER (Arkangelsk); D-ro MONTI (Milano); D-ro MUSZKATBLAT (Warszawa); P-ro NISHI (Tokio); P-ro OGATA TOMIO (Tokio); D-ro OMELSKYJ (Cernauti, Rumanujo); D-ro PACE (Specia, Italujo); D-ro PENCIK (Harkovo); D-ro PRZEDBORSKI (Warszawa); D-ro ROBIN (Warszawa); Farm. ROUSSEAU (Bécon-les-Bruyères, Francujo); D-ro SKALSKIJ (Leningrad); D-ro ŠIPIN (Voroneĵ); D-ro ŠUPIN (Leningrad); D-ro TANKOW (Soĉi, Kaŭkazo); D-ro VAN BECELAERE (San Diego); D-ro VAN DER BIEST (Bruxelles); D-ro WELEMINSKY (Praha); Farm. WILTSCHKE (Bratislava); S-ro WOODRUFF (London); D-ro LEONO ZAMENHOF (Warszawa); D-ro ADAM ZAMENHOF (Warszawa); D-ro ZURKOWSKI (Kielce, Polujo); k. t. p.

ANONCOJ

M. WITTENBERG, 23, Gieselerstrasse, Berlin (Germanujo).

TUTMONDA ESPERANTISTA KURACISTA ASOCIO (T.E.K.A.)

ESTRARO

Prezidanto: D-ro W. ROBIN, 113, Marszałkowska, Warszawa. — *Vic-Prezidantoj*: P-ro NISHI, Tokio, kaj D-ro BLUTH, Neuenahr. — *Ĉef-sekretario*: D-ro KEMPENEERS, 19, avenue Montjoie, Uccle 3. — *Ĉef-kasisto*: D-ro G. CANUTO, via Pallamiglio, 15, Torino 116. — *Redakcianoj de I. M. R.*: P-ro VANVERTS (Lille), D-roj ROBIN (Warszawa), BRIQUET (Lille), KEMPENEERS (Bruxelles) kaj BLASSBERG (Krakow). — *Estraranoj*: D-roj FELS (Lwow), ULMAN (Mukaĉevo), VAN BECELAERE (San Diego).

LANDAJ KASISTOJ

Francujo: D-ro BRIQUET, rue Solferino, 34, Lille (Poŝteĉkoj: Lille 30.25). — *Germanujo*: D-ro RENKEN, Hafen, 26, Bremen. — *Japanujo*: D-ro RYOZOI-URA, Anatomia Instituto, Medicina Fakultato, Tokio. — *Meksikio*: D-ro AMBROSIO VARGAS, 7a de Bravo, 95, Mexico, D. F. — *Polujo*: D-ro MUSZKATBLAT, Krochmalna, 15, Warszawa (Poŝteĉkonto 12.651). — *Svisujo*: D-ro WANNER, avenue Georgette, 1, Lausanne.

KONSULOJ

Danujo: D-ro J.-H. Leunbach, Stockholmsgade, 39, Kopenhago. — *Finlando*: D-ro Salokannel, Salmi-nen st. — *Francujo*: D-roj Cotar, Vichy; Dardel, Aix-les-Bains; Gros, Apt (Vaucluse). — *Germanujo*: D-ro Schwab, Pariserstr. 3, Berlin W. 15. — *Grekujo*: D-ro Stamatiadis, Rodou 21, Ateno. — *Hispanujo*: D-ro Bremon Masgraŭ, Carrer Balmes 102, Barcelona. — *Litovujo*: D-ro J. Kovarskis, Merkine, Alytus. — *Japanujo*: D-ro Yagi Hideo, Medicina Fakultato Imperia Universitato, Kioto; D-ro Toma-saburo Ogata, Patologia Instituto, Tokio. — *Jugoslavujo*: D-ro Črlenjak, Palmotiĉ str., 20, Zagreb. — *Polujo*: D-ro Leon Zamenhof, Marszałkowska, 125, Warszawa. — *Sovet-Unio*: D-ro M. Fomina, Rustaveli, 15 Batum (Kaŭkazo); K-do Snejko, poŝtkesto 33, Minsk (Blankrusio); D-ro Babadagly, Zolo-tovorotska, 6/30, Kiev; D-ro Skalskij, Jelabova, 1/56, Leningrad. — *Usono*: D-ro Van Becelaere, 220, Laurel Street, San Diego (Kalifornio).

ORIGINALAJ ARTIKOLOJ

NIAJ REZULTOJ KUN RADIUMAJ KURACILOJ

de D-ro L. RIEDL (Praha-Ĉeĥoslovakujo).

615. 849. 7

Pri efiko de radiumaj kuraciloj en formo de injektoj, inhaloj kaj kompresoj mi volas referi en tiu ĉi bulteno. Ĉiu kuracisto scias, kiel bonan rimedon ni en radiumo havas kaj precipe ni, ĉeĥoslovakaj kuracistoj havas bonan okazon kuraci pere de ĝi, ĉar nia ŝtato enhavas plej riĉajn mintroviĝejojn de ĝi. Injektoj aplikataj estas po 1 kaj 2 milikurioj, aparatoj por inhaloj havas 25.000, 100.000, 2000 Maheajn unuojn, kompresoj enhavas 0,008, 0,063, 0,03, 0,1 mgr. da Ra. Specialaj aparatoj por inhaloj estas konstruataj, ankaŭ tiuj por trinkkuracado. Ili estas el blanka metalo nerustiĝema, elegantaj (*). Ekzistas ankaŭ aparatoj grandegaj, kiuj estas vendataj en fremdlando, precipe en Anglujo.

Kuracitajn kazojn ni numeras :

1a. — *Reŭmatizmo de artikoj* : kompresoj 0,1 mgr. Post 7 tagoj, la doloroj tute malaperis.

2a. — *Bronkito kronika* : plibonigo de stato post 10 tagoj, ĉiutage matene kaj vespere inhaloj 20.000 M. U.

3a. — *Parezo de malsupraj ekstremaĵoj kun atrofio de muskoloj*; injektoj po 2 milikurioj en muskolojn (du serioj po 12 injektoj); post du monatoj la malsanulino foriras sen bastono, kvankam ŝi estis alportita.

4a. — *Inflamo de limfaj glandoj submandibulaj*; post 6 semajnoj sen operacio malaperis edemo kaj doloro.

5a. — *Bronkito kronika*; trinkkuro de 100.000 M. U. tage; plibonigo de stato precipe de tuso; la malsanulo povas nokte dormi kaj nature ankaŭ la stato de koro estas pli bona.

6a. — *Hipertireozo* (tireoida glando kiel pometo); post 6 semajnoj stato tute normala.

7a. — *Dua kazo de hipertireozo* (glando malmola kiel ŝtono, doloras, ĉirkaŭaĵoj ankaŭ); doloro malaperis, sed la glando restis neŝanĝita.

8a. — *Limfoglandoj submandibulaj, inflamitaj, edemo ĉirkaŭe*; post 11 tagoj ĉiuj malaperis sen operacio.

9a. — *Poliartrito reŭmatika*, precipe en maldekstra mano, kie artikoj estas inflamitaj, kaj malsanulo suferas pro doloroj; post 14 tagoj doloroj kaj inflamo tute malaperis.

10a. — *Frostorundoj de ambaŭ manoj* jam unu jaron persistanta : kompresoj je 0,03 Ra; manoj ŝvelis, doloris dum kvar tagoj, poste la haŭto senŝeliĝis, doloroj malaperis, post 14 tagoj, la manoj aspektis preskaŭ normale.

(*) La materialo uzata de la aŭtoro devenas de la ĉeĥoslovaka kemia fabriko Kolin.

11a. — *Stato post frakturo de vertebro en lumba regiono* : doloroj, la malsanulo ne povas moviĝi, nokte pro ili li ne dormas, aspektas lace, ne manĝas; kompreso po 0,1 mgr. Ra. Post tri semajnoj tute alia malsanulo : freŝa, li dormas bonege, povas marŝi kun bastono, la doloroj preskaŭ malaperis.

12a. — *Neŭralgio trigemina maldekstre*; kompreso je 0,03 mgr. Ra. Dum nokto malaperis doloroj tute.

13a. — *Obstipo*, la malsanulino fekas post 4-7 tagoj; trinkkuro de Karlsbad'a salo solvita en akvo enhavanta 100.000 M. U.; regula fekado post 10 tagoj, ĉiutage, sen doloroj, sen sangado el intesto.

14a. — *Neŭralgio de peroneo dekstra*; kompreso 0,1 mgr. Ra; doloroj malaperis post du tagoj tute.

15a. — *Laringito kronika* kun intensa tuso; kompreso 0,063 Ra; plibonigo de stato post 14 tagoj, poste la malsanulo foriris.

16a. — *Stenozo de laringo post trakeotomio; keloido en cikatro*; radiumaj injektoj po 1 milikurio en keloidon, kiu post 16 injektoj tute malaperis.

17a. — *Krura frakturo komplikila*; doloroj en genuo, ŝveliĝo, tie kaj en artiklo talokrura; kompresoj je 0,063 mgr. Ra sur genuon, sur talokruran artikon; ŝveliĝo post 10 tagoj preskaŭ malaperis, la malsanulo promenas sen bastono.

18a. — *Reŭmatismo en dekstra karpea artiklo*; kompreso je 0,063 mgr. Ra, la artiklo aspektas post tri semajnoj tute normale, sen doloroj; la malsanulino povas labori la tutan tagon sen laciĝo.

Aliaj malsanuloj estas en kuracado. Ni volis nur atentigi niajn kolegojn pri tiu ĉi terapio, kiu donas multajn belajn sukcesojn.

.....

PRI LA ETIOLOGIO DE STOMAK-ULCERO

de D-ro Sydney PUGMIRE,

L.M.S.S.A. (Londono).

—

Unu el miaj unuaj kazoj mi observis kiam mi estis studento : estis junulo kiu havis sang-vomadon aŭ stomaktraboriĝon, mi forgesis kiun. En la historio mi notis, ke inter manĝoj li estis trinkinta tason da teo, kaj tuj kolapsis.

En la virina fako de la sama hospitalo, mi observis, je la sama momento, alian kazon kun simila historio : engluto de teo dum la stomako estis malplena.

De tiam mi ĉiam demandis ĉiun kazon de sang-vomado aŭ stomaktraboriĝo, kaj preskaŭ senescepte estis en la historio trinkado de varma teo, la stomako estante malplena.

Mi kredas ke la varmaj likvaĵoj pligrandigas la angiojn kaj estas la kutima kaŭzo de sang-vomado aŭ stomaktraboriĝo.

.....

El la Fizilogia Laboratorio de Medicina Fakultato de Niigata, Japanlando.

LA NORMALA MOVADO DE LA MALDIKA INTESTO

(Observado per ventrofenestromedo kaj kinematografado)

de HUKU-HARA-T,

Laŭ mia observado pri la normala movado de l'maldika intesto la rezultoj estas tute aliaj de tiuj de ĝisnunaj aŭtoroj, kaj estas mallonge resumigataj kiel jene :

1) La ventrofenestrometodo estas plej fiziologia, krom la rentgenmetodo, por studi la movadon de la maldika intesto kaj ĉi tiuokaze per la utiligo de kinematografo oni pli facile konstatas ĝian movadon tre precize, kvankam ĉe la uzado de la lasta ĝia nesufiĉa sentemeco por seriofotografado ne trafas la celon, kaj cetere tiuokaze oni ne povas trovi ankaŭ la markon sur la muro de la intesto.

2) La fundamenta principo de la movado de l'maldika intesto en la fizilogia stato konsistas el tio, ke la agitado okazas unue ĉe la buŝoflanko kaj aliras sekvante anusflanken. La rapideco de alirado tamen dependas de la speco de besto.

3) La opinio de CANNON pri la ritma segmentiĝado devas esti korektata jene. La enŝnuriĝo ne okazas samtempe en unu parto de la intesto ĉe kato. Ju pli anusflanke la enŝnuriĝo okazas, des pli malfrue ĝi komenciĝas. Sed la enŝnuriĝo okazas en unu loko post la alia en minimuma tempo, tial ŝajnas makroskope kvazaŭ la intesto-parto kontraktus preskaŭ samtempe. Ĉiuj enŝnuriĝoj komence malstreĉiĝas sendepende de la maksimuma de kontraktado tuj post ĝi estas maturiĝinta por ke ĝi okazu denove post tre mallonga ripozpaŭzo. En la sekvanta momento dua kontraktado okazas ne en la mezo de la antaŭa segmento, sed en la rekte pli malproksima parto anusflanke de l'antaŭa. Post iom da tempo, kiam tiuj ĉi novaj enŝnuriĝoj revenas al la ripozpaŭzo, komenciĝas malstreĉiĝi la pli anusflanke kuŝantaj, tamen per malpreciza observado ĝi malstreĉas ŝajne kvazaŭ samtempe. CANNON ne observis tiun ĉi ripozpaŭzon. La duaj kontraktadoj povas okazi ankaŭ ĉe la buŝoflanko, aŭ jen tiu-ĉi-flanke jen aliflanke de la unuaj. Ĉe hundo la intestoparto enŝnuriĝas ne tiel forte pilkforme kiel ĉe kato. Ĉe kuniklo, se la aliradrapideco de unu post la alia sekvanta enŝnuriĝo de ritma segmentiĝado estas mezurata en ĉiu sekundokono tiam la impresoj estas neniam samtempa kiel ĉe kato eĉ per makroskopa observado.

4) Estas unu tipo, en kiu la intestoparto forte enŝnuriĝas unue ĉe la buŝoflanko kaj tuj post kiam la malstreĉiĝo finiĝos, unu alia kontraktado okazas kelke da centimetroj anusflanke por ripeti daŭre tiun ĉi procedon. Oni povas konstati ofte tion ĉi ĉe hundoj, kunikloj kaj marmotoj, kaj povas rekoni kiel varianto de ritma segmentiĝado.

5) La longeco de l' tra ventrofenestro videbla intestoparto restas senŝanĝa kiam la pozo de eksperimentbesto ne estas ŝanĝata. La diametroj kaj la interspacoj de la inter ĉiuj enŝnuriĝoj kuŝantaj senmovaj partoj restas ankaŭ senŝanĝaj. Tial mi povas tute prave diri : La enŝnuriĝringo komenciĝas per kontraktado de l' ringmuskoloj kaj

malstreĉigado de la laŭlongaj muskoloj de la sama loko, kaj sekve malstreĉigado de l' ringmuskoloj kaj kontraktado de la laŭlongaj muskoloj de l' sama parto estas okazigata denove post la ripozpaŭzo. Ambaŭ muskoltavoloj de la intestotubo ripetadas kontraktadon kaj malstreĉigadon reciproke. Tiu ĉi fenomeno estas facile klarigata per la « Dehnungsgesetz » (Etendiĝleĝo) de UEXKULL. Laŭ la leĝo de BAYLISS kaj STARLING ne taŭgas klarigi bone tiun ĉi aferon, ĉar tiuj ĉi aŭtoroj insistas ke la ring- kaj laŭlongaj muskoloj ĉe la sama loko faras kontraktadon kaj ankaŭ malstreĉigadon tute samtempe.

6) Mi difinas la pendolmovadon kiel la movadon kaŭzitan de la laŭlonga muskoltavolo. Ĝi estas klare observebla ĉe kuniklo kaj marmoto. La kapablo kunmiksi la himon per tiu ĉi movado estas tre malgranda. Tial do oni ne povas konsideri ĝin kiel la gravan movadformon.

7) La peristalto okazas pli ofte ĉe la herbomanĝantaj kuniklo kaj marmoto ol ĉe la viandomanĝantaj hundo kaj kato. De la loko, kie enŝnuriĝo okazis unue, montriĝas ringmuskolkontraktado sekvanse unu post la alia kaj per ĝia maksimuma kontraktado la intestotubo plilongiĝas, por ke ĝi povu denove malstreĉiĝi sekvanse de l'unua kontraktoloko. Mi neniam vidis la aktivan dilatadon de l'intestotubo, kiu aperas antaŭe de la enŝnuriĝo. La himo estas transportata anusflanken kvazaŭ alŝpruĉata per peristalta movado. Tiam li himo estas nekunpremebla, ĉar ĝi estas plejofte duonfluida. La leĝo de BAYLISS kaj STARLING « the law of the intestine » (la leĝo de la intesto) ne estas aplikebla al la maldika intesto kiu troviĝas tute en normala stato. La antiperistalto ne ekzistas en la normala stato de l'intesto.

8) Ĉe la normala stato okazas neniu rulmovado en la senco de VAN BRAAM-HOUCKGEEST.

9) Ni povas konstati ankaŭ ĉiujn tri specojn de movadoj t. e. ritma segmentiĝado, pendolmovado kaj peristalto ĉe la malplena stato de l'intesto. La ritma segmentiĝado montriĝas kun tute sammaniera ritmo kiel ĉe la plena intesto, sed ĝia kontraktogrado estas plej ofte malpli granda, sekve ĝia ripozpaŭzo estas ankaŭ relative iom pli longa. La tempo, ĝis kiam la nova ritma movado reokazas, estas pli longa ol kiam la intesto estas plena. En la malsata stato okazas miksanta movado de ritma segmentiĝado kaj peristalto.

10) Ĉe kato kaj hundo, laŭ humorartoj kiel koreliĝo, malĝojo, k. t. p., la movado de intesto subite haltas kaj tonuso malaperas. Tio koincidas kun la observado de CANNON.

11) En la plena stato oni preskaŭ ne povas vidi la influon de l' dormado. Se la intesto estas tute senenhava, la movado ĉe la komenco de l' dormado fariĝas ĉiam pli longedaŭra kaj malpli forta kaj la tonuso malfortiĝas, kaj post kelkaj minutoj ĝi fariĝas fine komplete kvietita. Dum la dormado okazas ĉiujn kvaran aŭ kvinan minuton malforta movado, kiu ĝenerale daŭras dum 1 ĝis 1.5 minutoj.

Trad. KINOSE-S.

CALCIUM-SANDOZ

La granda antaŭenpaŝo de la **Kalciterapio**,

STOMAKA

bone tolerata kaj asimilata

per vojoj:

VEJNA

rapida agado

MUSKOLA

je efikaj dozoj

POSTULU LITERATURON KAJ SPECIMENOJN DE
FABRIKO DE ĤEMIAJ PRODUKTOJ antaŭe SANDOZ
BALE-BASEL 13 (Svisujo).



Efikaj klinike elprovitaj specialaj preparadoj de D-ro Richard Weiss

Enkondukitaj en pli ol 50 landoj de la mondo

Virilinets
mask.

Fertilinets
fem.

aktivigitaj, standardi-
zitaj hormon-prepar-
aĵoj por efika kon-
traŭbatalado de tro-
fruaj aĵoj de
maljuniĝo neŭrasteno
k.t.p.

Santuben

laŭ prof. Wolff-Eis-
ner por la trahaŭta
kuracado de tuber-
kulozo.

20-jara praktiko en
preskaŭ 20000 kazoj.
Rekomendita i. a. de
d-ro Besredka, Pari-
zo, ĉefkuracisto d-ro
Eckstein, d-ro Gun-
ter, Londono.

**Leanogin-
Dragées**

Aktivigita hormon-
preparaĵo, ligita kun
vegetaj ekstraktoj por
kontraŭbatalo de en-
dokrina adipozo.

En la *L-dragées* laŭ
d-ro Weiss unuafoje
estas prezentita hor-
monpreparaĵo sur sci-
enca bazo, efike for-
iganta la kaŭzojn de
la adipozo.

Pancresalets

Pankreas - Hormon-
Tablojdoj kontraŭ
diabeto suĝera. Unika
aktivigita rimedo per-
buŝe aplikebla por ra-
pida redukto de la
suketa eligo.

Sciencaj literaturaĵoj kaj porkuracistaj specimenoj je dispono

D-ro Richard WEISS, fabrik. de farm. prepar., BERLIN, NW 6, Luisenstrasse 51

NEO-PHYSIOSTHENINE

ĈIUJ INFEKTOJ

Skatolo po 8 ampoloj de 5 ccm.

Uzata en la Malsanulejoj de Paris.

Injekto kaj reago malmulte aŭ ne dolorigaj, per 5 cm-a nadlo enigita perpendikulare en la post-trohantera regiono (Punkto de Barthélemy).

Pr-o LEREBOUILLET kaj SAINT-GIRONS, asistanto: Klinikaj lecionoj, faritaj en la Hospitalo por Malsanaj Infanoj, pri la kuracado de la bronĥo-pneŭmonioj.

D-ro PASCAL, ĉefkuracisto de la publikaj mensmalsanulejoj de la Seine kaj Jean DAVESNE: Kuracado de la mensmalsanoj per la ŝokoj.



Antineuralgicum
Antirheumaticum
Antipyreticum
Antidolorosum

La malmultekosta fidele efika

Phenalgetin

Aschval. Phenalgetin 22 0.25 Ccm. ph. 0.01 Nec. Col. 0.05

DR. HUGO NADELMANN • STETTIN

REFERATOJ

HIDEO SHINODA. — **Pri la korpa stato de la matura japana novnaskito; statistika studo.** (El *Rinsho Sanka Huĝinka* (Kliniko de Obstetriko kaj Ginekologio), n-roj 4 kaj 5, 1931.)

572. 512 (52)

La aŭtoro liveras ciferojn post ekzameno de pli ol mil infanoj en la Tokia Ginekologia-Obstetrika Kliniko. (P-ro M. KAWAZOE). Jen la ĉefaj mezkvantoj :

Staturo 50,2 cm. *Korpa pezo* : 3.106 gr.

Kapdiametroj : fruntokcipita : 11,1; bitempia : 7,7; biparieta : 9,3; bregmo-subokecipita : 9,5; mentonokcipita : 13,2. *Kapĉirkaŭo* : 33,5. *Kapindicoj* : longitud-latituda : 83,7 (braĥicefaleco); transversa (frunt-parieta) : 83,4. Preskaŭ samaj ciferoj. *Fruntfontanelo* : laŭlonge 3,6; laŭlarĝe : 1,6. Ĉe la japana novnaskito troviĝas preskaŭ nenia korelativeco inter la dimensioj de la fruntfontanelo kaj la graved-daŭro, la korpa pezo kaj la korpa ĉirkaŭo.

Sultro-ĉirkaŭo : 35 cm. 5. *Brustĉirkaŭo* : 32 cm. 8. *Umbilikŝnuro* : 54 cm. 1. *Postnaskaĵo* : 558 gr. Tiu pezo varias sufiĉe paralele kun la korpa pezo. Rilato I : 5,8. La ciferoj koncerne la virinnaskitojn estas ĝenerale iomete pli malaltaj ol ĉe la virnaskitoj.

Estus tre interese kompari la suprajn ciferojn kun tiuj kiuj koncernas alilandajn, aliracajn infanojn.

BRIQUET (Lille).

LECORNU kaj PECKER. — **Toksigo per karbontetraklorido.** (El *Bruxelles-Médical*, 21-2-1932.)

615. 9

En la industrio oni pli kaj uzadas karbontetrakloridon. La aŭtoroj referas pri mortiga kazo. En kelo okazis brulego inter elektraj fadenoj je alta tensio. Laboristo per uzo de iom multe da karbontetraklorido ĝin estingis. Alia laboristo, veninta por la riparo restadas du horojn en la kelo sen pertubo, sed, hejme alveninta, suferas kapdolorojn kaj naŭzojn. La sekvantan tagon aperas vomoj, iktero (sen dekoloriĝo de la fekaĵoj sed kun ampleksiĝo de la hepato); nur 50 gr. da urino tage. La sekvantajn tagojn anurio, nazhemoragioj, purpuro, malvigleĝeco; la vomoj daŭras; faca edemo; la hepato iĝas pli malgranda. Morto kaŭzita de hepato-nefrito 10 tagojn post la toksigo.

BRIQUET (Lille).

A. LUMIERE. — **Pri heredo-tuberkulozo.** (El *Le Phare Médical de Paris*, XIa jaro, n-ro 120, decembro 1932.)

616 -002. 5 -056. 7

Depost la eksperimento de Villemain oni injektis al bestoj la bacilon de Koch, nerimarkinte ke la *eksperimenta* malsano, tiel inokulita, estas ganglionaviscera, ĉiam mortiga, ĉiam *samforma* kaj tute ne simila al la homa tuberkulozo, *poliforma* kaj ofte kuracebla (vidu ostan tuberkulozon). Kiel tion klarigi? Ĉu estas du tuberkulozoj?

Rimarku : 1) Ke oni povas inokuli al besto la poliforman tuberkulozon se oni al ĝi injektas la bacilon antaŭ naskiĝo, aŭ se oni injektas al ĝi filtran viruson.

2) Ke povas okazi ĉe homo la supredirita *eksperimenta* tuberkulozo se la bacilo eniris ĉe novnaskito, antaŭ ol aperis ĉe li du defendadoj, t.e. unue, speciala limfa teksaĵo ĉe intesto; due, imuneco kaŭzata de enkonduko en lian organismon de eksteraj bacilaj proteinoj kies ekziston oni povas montri per kutireago. Tiu dua defendado ne okazas ĉe homoj kiuj neniam estis kontakte kun tuberkulozoj (ekz. negruloj k.t.p.); tial, se la bacilo eniros en ilian organismon, ili ankaŭ estos trafitaj de eksperimenta tuberkulozo, gangliona-viscera, ĉiam mortiga same kiel ĉe bestoj.

Ree estas du *tuberkulozoj*, unua, kaŭzata de Kochbacilo (besta formo), dua, kaŭzata de filtra viruso kaj de desintegritaj baciloj; la dua estas la tuberkulozo de la plenkreskulo, ĉiam hereda, ĉar por akiri tian tuberkulozon ĝi devas esti inokulita antaŭ naskiĝo.

La aŭtoro konstatis ke ĉe 211 geedzoj (kies unu, aŭ du, estis tuberk.), 231 idoj iĝis tuberkulozuloj; ĉe sanaj geedzoj la idoj restis sanaj malgraŭ tuberk. kontaktoj.

Por la heredeco de la tuberkulozo, la aŭtoro liveras multajn aliajn argumentojn.

Ekz : 1) Se ili ne estas heredo-tuberkulozuloj neniam aperas tuberkulozo ĉe fiziologoj, ĉe servistaro en sanatorioj aŭ hospitaloj, ĉe edzo aŭ edzino kies kunulo estas tuberkulozulo.

2) Dum multaj miljaroj oni opiniis kun Hipokrato ke la tuberk. ne estas kontaĝia, sekve estis neniu antaŭgardado; ĉu pli da tuberk. ol nune?

Do luktu kontraŭ la heredeco, sed ne kontraŭ la bacilo per infanaj preskriboj. (Kraĉuoj, izoligo, k.t.p.).

BRIQUET (Lille).

DELATER. — **Novaj konoj pri patogenia meĥanismo de flebitoj, iliaj antaŭoriga kaj resaniga kuracadoj.** (El *Phare Médical de Paris*, XIIa jaro, n-ro 122, febr. 1933.)

616. 14 -002

Flebitoj povas *sensimptome* evolui en la ĉirkaŭaĵoj de kelkaj organoj. Ekz : el la utero, inflamo povas atingi la ilia kan vejnnon, kaj okazigi emboliaĵon, aŭ blankan dolorigan flegmazion. Ili propaĝas ĉu etendiĝante, ĉu intertuŝe (ekz : el la apendico al apudeca iliaka ekstera vejno), ĉu metastaze (per mikroboj enirintaj en sangon). La du unuaj flebitoj, diritaj « rampaj », estas danĝeraj kiam ili okazas ĉe mallongaj vejnoj kiuj rapide kondukas al gravaj vejnoj profundaj. La triaj, diritaj « metastazaj », okazas preferinde en supraĵaj vejnoj kaj kutime kaŭzas nur lokajn perturbojn.

Timu la sensimptomajn flebitojn ĉe akuŝintinoj aŭ operaciitinoj ĉe kiuj ekzistas utera afekcio, intesta stazo, urinaj perturboj. Por malhelpi al ilia apero :

1° Neŭtrigu la bakteriajn pululaciojn : ĉe intesto per antikulibacila vakcino, antifermenta dieto, laksigiloj; ĉe urina aparato per diurezigoj, antisepsigo de urinaj kaj generaj vojoj.

De Trouette-Perret

APHLOÏNE

Specifa rimedo kontraŭ la
malordoj de la Menopauzo
kaj de la vejna aparato.

LA NISAMÉLINE

(GUAKO)
Jukoj-Ekzemoj-Prurigoj
Neŭralgioj

LA PAPAINÉ

Gastro-Enteritoj-Laksoj
Vomoj
Dispepsiaj malordoj

PARIS — 15, Rue des Immeubles-Industriels — PARIS

Dumex-Salbe

En tuboj

1. LA CEFA

Kontraŭhemoroida rimedo

KUN PLENA EFIKO

origina tubo kun kanulo po 35 gr. kaj anstataŭanta tubo



Science rekonata

eminenta preparaĵo!

konstatita per komparo kun konataj kontraŭ-hemoroidaj rimedoj farita de D-ro Thom, fako de interna medicino de la

Airurg. Univers. Polikl., Berlin

kontraŭas inflamon, forigas jukeksiton, malhelpas doloron, haltigas sangadon

Glitrimedo

vekanta fekadon.

En skatoloj

Speciala unguento kontraŭ

Krurdoloroj

kaj por ĝenerala vundterapio
po 20, 60 kaj 150. Klinikpakajo po 400 gr.

En ovula formo

PLEJ AGEMA

FLUORPREPARAĴO

por utero-vagina kuracado
6 pecoj kaj 1 dekduo. Klinikpakajo 3 dekduoj.

Krurulcero, dekubita eskaro, intertrigo, brulvundo, dermito, urtikario, ĉiuspeca prunito, malseka ekzemo.

Flebito kaj trombozo

Liter.: O. Köster, la univers. akuŝliniko, München, « Münch. med. Woch. », 1931, n-ro 40.

Forigas radikale inflamajn statojn de mukoza, jukadon kaj brulojn, kontraŭ erozioj, ŝvelaĵoj, vaginito, kataro, hemoroidoj, prostatito.

Post akuŝo, operacio, kaŭterizo, surradiado.

Liter.: H. Fink, univers. virin-kliniko, Leipzig. P-ro D-ro Sellheim « Der prakt. Arzt. », 1929.

Literaturo kaj specimenoj laŭdezire
Spariga Uzebla por malsanulkaŝoj

Laboratorium Miros, Dr. K. & H. Seyler, Berlin NO 18

Laboratorioj BRUNEAU kaj K^{io}

(MARKO TRIOLLET)

PARIS — 17, Rue de Berri, 17 — PARIS

LIGILOJ STERILAJ AŬ NE

Katgutoj — Firenzaj Haregoj — Silkfadenoj — Linfadenoj — Bronzfadenoj

KAŬĈUKAJ ARTIKOLOJ KAJ GANTOJ

“Cutiplaste” BRUNEAU

SPARADRAPO KUN ZINKOKSIDO PERFEKTE ALGLUIĜANTA

Agento por Belgujo : Marcel DU BLEU, 192, rue des Palais, Bruselo

Seksa Nervastenio OKASA

LAŬ SEKRETA KONSILANTO D-RO MED. LAHUSEN

Okasa Silber

por viroj

Okasa Gold

por virinoj

kiel afrodiziĝa rimedo elprovita de jaroj

Okamen

kontraŭ klimakteriaj malordoj

KONSISTO

OKASA enhavas pluriglandajn ekstraktojn kun plena hormonenhavo kaj organekstraktojn. Ankaŭ bone studata eksterlande kiel afrodiziĝilo.

La hipofiza kaj generglanda hormonoj estas standardizitaj.

OKAMEN enhavas hormonan ovarian kaj lian-substancon, vegetajn substancojn kun reguliga ago sur koron, renojn kaj nervojn. Sendoloriga rimedo.

Senkostajn specimenojn postulu de

HORMO-PHARMA G.m.b.H. BERLIN S 14 (Germanujo)

Oerelin

Ol. lavend., Ol. macid., Ol. pin. silv., Ol. fereb.,
Camph., Ammon., Thymol. Alc.

kl.o.p. 1.10

Ekstera frotrrimedo kontraŭ
neŭralgiaj kaj reŭmatikaj difektoj,
ishia neŭralgio, sportdifektoj.
Permesita de multnombraj malsanulkasoj.

Fineural

Promisoval. urea Q2, Pyz. d.m. aminophenyl,
tim. Q2, Card. phosph. Q005 Extract bellad. Q3

Por dolorforigo kaj tranquiligo
en neŭralgioj, gripo kaj dismenoreo.

10 Tabl. 0.55
20 Tabletten 0.55

Oerelin estas enskribita en la formularo de la
germana kuracil-komisiono, V. eld. p. 150.

Dr. Oehren & Co. Berlin SW 61

2° Neŭtrigu la flebithelpan stazon per ne troa senmovado en la lito, opoterapio, kortonusaj rimedoj.

3° Atentu pri la sanga koagulkapablo; se ĝi estas troa, receptu, nur tri tagojn post akuŝo aŭ operacio, natrian citraton, hirudojn (ne, se ekzistas sepseco). Kelkaj akuŝistoj aŭ ĥirurgoj malprave konsilas fruan levigon.

Kuracado de la rampaj profundaj flebitoj : Por ke ne moviĝu la koagulaĵo, konsilu senmovadon en la lito, kun plialtigitaj kalkanoj (10-15 cm.) kaj subpoplita kuseneto. Ĉe duobla flebito meĥanika lito estos utila; ĉe unuflanka sufiĉos envolvigo en kombita kotono. Post tri tagoj malrapide movigu la piedfingrojn, la genuojn, la koksojn; post du semajnoj la malsanulino mem movigos siajn artikojn, « promenados » en la lito, poste iom post iom leviĝos.

Kontraŭ la vejna infektiĝo uzu septicemion, elektrargolon, vakcinojn (enterokola), ĉu perbuŝe, ĉu subhaŭte, laktatajn fermentojn, laksigilojn, diŭrezigilojn.

Kuracado de la supraĵaj flebitoj : Litripozio. Malsekaj bandaĝoj dum 8 tagoj; poste leviĝo kun malsupraj membroj zorge envolvitaj. Se sepseco uzu la suprediritan kuracadon.

BRIQUET (Lille).

SCHERMANN. — **Aldono al terapio de pulma tuberkulozo.** (El *Medycyna praktyczna*, n-ro 11, 1931.)

616. 24 -002. 5

Ĉe 22 gemalsanuloj la aŭtoro enŝprucadis enmuskolen ekstrakton de lieno. Li uzadis ĉiutage ampolon po 10 cm³ sume 20-40 ĉiutagajn enŝprucojn. Krom 3 senefikaj kazoj, el kiuj unu havis tuberkulozon de laringo, ĉiuj pliboniĝis dum la tempospaco de 2-4 monatoj. La pliboniĝado de la stato estis evidenta en pliboniĝado de la korpopozo je 3-7 kg. dum 2-4 monatoj. La aŭtoro observadis ankaŭ bonajn efikojn, sed ne tiom evidentaĵojn, ĉe aplikado de la liena dieto de Fliegel. Ĉe tiu dieto malsanulo ricevas dum 4 semajnoj ĉiutage krudan, ne kuiritan bovidan lienon, disfrotitan en supo, aŭ duonrostitan anglamaniere, en ĉiutaga kvanto de 50-100 gr. Post dusemajna paŭzo oni ripetas la dieton 2-3 foje. Ne ĉiuj malsanuloj povis manĝi lienon. Kelkaj englutadis ĝin facile popece, aliaj faris el ĝi krudan pasteĉon kune kun malmolkuiritaj ovoĵ, graso kaj spicoj.

BLASSBERG (Krakow).

PIOT. — **Ĉu radiologia diagnozo de abdomenaj algluaĵoj estas ebla?** (El *Phare Médical de Paris*, XIIa jaro, n-ro 122, febr. 1933.)

616. 34 -007. 274 -073. 75

Per X-radioj oni ne povas *vidi* la abdomenajn algluiĝojn, sed oni povas ofte ilin diagnozi kondiĉe ke oni zorge serĉu ilin. Dum du plenaj tagoj, per multaj mallongaj ekzamenoj, oni esploras ĉe duodeno (stazo, antiperistaltismo), ĉe ileo (vermoformaj bildoj, spasmoj, dilatiĝoj, trodaŭra transiro, aeraj veziketoj), ĉe ileo-cekuma regiono, sidloko de multaj perivisceritoj (palpado de apendica sidejo

kaj de la apudaj regionoj, serĉo de la movebleco de la cekumo), ĉe kojlonoj (pri la maldekstra kojlo estas necesa la uzo de klistero); se ekzistas daŭra aspekto akordiona, kvazaŭ-segildenta, oni povas certigi perikojloniton.

BRIQUET (Lille).

MOUZON. — **Krudaj pomoj en la kuracado de diareoj.** (*El Presse Médicale*, n-ro 51, 1932.)

616. 34 -008. 314. 4 -8

Jam de longe unuopaj kuracistoj observadis bonan kuracefikon de pomoj ĉe la diareo. Sed Moro en Heidelberg la unua uzadis la metodon sisteme ĉe la infanaj diareoj. Oni prenas maturiĝintajn fruktojn, senŝeligas kaj forigas la nemanĝeblajn partojn. Poste oni ilin raspas aŭ frakasas kaj faras delikatan molajon, kiun la malsanuloj manĝas krudstate, sen sukero. Laŭ aĝo, apetito kaj gusto la kvanto estas 100-300 gr. por manĝo, tio estas 500-1500 gr. potage aŭ ĉirkaŭ 7-20 pomoj de meza granda. Dum 24 horoj neniu alia manĝo estas permesata kaj neniu medikamento donata. Kontraŭ la soifo iom da akvo aŭ da malforta teo estas permesata. La fekoj fariĝas samtempe pli maloftaj kaj pli densaj, malpli malbonodoraj. Ilia nombro malpliĝas el 10-15 ĝis 1-2 dum plentago.

La intestaj kolikoj malaperas, la febro malaltiĝas. La trian tagon oni interrompas la rigoran dieton, sed ne rekomencas tuj la normalan dieton. Dum kelkaj tagoj la legomoj estas malpermesitaj. Kelkaj aŭtoroj malpermesas la lakton sed permesas dum tiu ĉi transitiva periodo teon, kakaon je akvo, biskvitojn, malfreŝan panon, freŝan buteron, bananojn, blankan fromaĝon, terpoman kaĉon, malgrasan viandon, la mirtelojn eĉ la ovojn. En kazo de remalsaniĝo, kio okazas tre malofte, oni denove rekomencas la dutagan rigoran dieton. Ĝis nun neniu ajn malutilo de tiu ĉi dieto estis observata nek ĉe plenkreskuloj nek ĉe la infanoj. Kelkaj aŭtoroj uzadas pulvoron el sekigitaj pomoj kiu valoras 600 kaloriojn en 100 gr. kaj estas flava pulvoro kun agrabla aromo kaj nomiĝas « Aplona ». En varma akvo aŭ malforta teo ĝi solviĝas en 5-10 minutoj. Oni al fluidaĵo ne aldonas sukron sed saĥarinon. Oni povas ĝin trinki en varma aŭ malvarma stato unu kafelektron (4 gr.) por 100 gr. da akvo, sed oni povas plialtigi, eĉ duobligi la dozon. Ĉiu porcio devas esti preparata aparte kaj freŝe. « Aplona » permesas uzadi la kuracmetodon de la sesa eĉ de komenco de la tria vivmonato. La dieto krudpoma estas plej uzata ĉe la akutaj enteritoj precipe ĉe la infanoj. Sed ĝi estas ankaŭ bonefika ĉe la disenterio, ĉe tifaj kaj paratifaj diareoj, ĉe la malsano Herter-Heubner aŭ intesta infantilismo kaj ĉe la mukkolikoj. La interpretadoj de tiu ĉi ne neigbla efiko estas tre diversaj kaj oni supozis ĉu influon de acideco ĉu de aliaj konsistaĵoj de pomoj sur la intestan floron. Moro supozas ke efikas la tanino enhavata en la pomoj, kelkaj akceptas ke la celulozo havas ensorbigan econ. Sed la demando ne estas solvita.

BLASSBERG (Krakow).

MUTOSAN

Klorofilin-Saponin-Silicio-preparaĵo elprovita de pli ol 10 jaroj
en la kontraŭbatalo de

TUBERKULOZO, BRONĤITO, TUSO

de grava signifo kiel profilaksilo post gripo, pulmaj kaj pleŭraj
inflamaĵoj por malhelpi kaj resanigi komencantan tuberkulozon.

MUTOSAN-SIROPO

1 botelo = kvanto por unu semajno

MUTOSAN-TABLETTEN

1 tubo = kvanto por unu semajno



D-ro E. UHLHORN K^{io}, Ĥemia Fabriko

Wiesbaden-Biebrich (Germanujo).

Tonika

NERVONUTRA KVIETIGA DORMIGA

NERVOPHYLL

Konsisto: Klorofilin, bromsalo,
fenagono, anidoprino, dietilbarbi-
turata acido en molekuloj,
kunigilo.

Solvaĵo en boteloj po 200 gr.
Premaĵoj en tuboj po 15 pecoj.
Literaturo je dispono.

MALALTAJ DOZOJ — GRANDECA EFIKSKALO!

SPETON

Profilaksa Vagina Desinfektilo

en

sengrasaj,
solveblaj premaĵoj

INDIKOJ :



Internacia protektita
fabrik-marko

Kontraŭ blanka fluo, metrito kaj erozioj.

Specimenoj kaj literaturo senpage al kuracistoj.

TEMMLER-WERKE
Berlin-Johannisthal
(GERMANUJO)

RAHIER. — **La stomaka sekrecio ĉe la urtikario.** (El *Presse Médicale*, n-ro 33, 1932.)

616. 514: 612. 323

La aŭtoro esploris ĉe 14 urtikariuloj akutaj kaj kronikaj la stomakan sekreciacion ĉe malplena stomako kaj post la prova matenmanĝo de Evald. Ĉe 7 el ili li trovis senklorhidrecon kaj ĉe 4 malpliigon de acideco de la stomaka suko. La aŭtoro supozas, ke en tiuj kaj similaj kazoj kaŭze de malpliigita ne kompleta proteoliziga povo de la stomaka suko la peptonoj enpenetras en la sangon elvokante urtikarion. En tiuj ĉi kazoj la klorhidrata acido en 2 % solvaĵo prenata de la malsanulo malaperigas la urtikarion dum 24 horoj.

BLASSBERG (Krakow).

H. STEIMTL. — **Pri iktero ĉe la diabetuloj.** (El *Deutsche med. Wochenschrift*, n-ro 40, 1932.)

616. 633. 6: 616. 36 -008. 5

Ce 27 diabetuloj el la ĝenerala nombro de 334 observitaj diabetuloj dum 2 vintraj duonjaroj ekaperis dum la kuracado la iktero. Inter ili estis 19 virinoj kaj 8 viroj.

La aŭtoro konkludas ke okazis infekteca malsano de neklara kaŭzo. La hepato, difektita de la diabeto perturbo de ŝtofinterŝanĝo, estas malpli rezistema je venenoj, devenantaj verŝajne de streptokokoj. Tial ĝi estas speciale disponita al iktero. Ĉe kelkaj malsanuloj estis observata ŝtofŝanĝperturbo de la fruktozo, kiu daŭradis ankoraŭ dum sufiĉe longa tempo post la akuta ekmalsaniĝo.

BLASSBERG (Krakow).

MORHARDT. — **Ĉu endokrinaj glandoj ludas rolon en la etiologio de reŭmatismoj?** (El *Vie Médicale*, 25-3-1933.)

616. 72 -002. 77 -02

Generalaĵoj. — H. DUFOUR opinias ke la endokrinaj glandoj neniun rolon ludas en kiu ajn formo de reŭmatismo. Laŭ H. DAUSET la malbona funkciado de tiuj glandoj povas nur krei terenon al ĝi favoran. F. COSTA, P. SAINTON, G. DREYFUS konsideras ke ilia agado ne estas pruvita; laŭ SCHLESINGER kaj BURKARDT tiu ĉi estas malprave tro valorigita; tamen LOEPER certigas ke oni ne povas ĝin nei.

Reŭmatismo pro ovaria nesufiĉeco. — COSTE, RICHARD, STEVENIN, tre dubas pri la ekzisto de ĝi. Kontraŭe LEVI opinias ke oni ĝin povas observi ĉe viriniĝo, kaj ĉe menopaŭzo (seka lipa artrito ambaŭflanka de WEISSENBAĤ kaj FRANCON, kaj intermita hidartrozo). HUMBER referas pri la afekcio kiun li nomis detruiga periartrito (sen ostoporozo). Laŭ SCHLESINGER la Heberden'a reŭmatismo kaj la intermita hidartrozo estas ambaŭ el ovaria deveno. Terapeŭtike laŭ STEVENIN la ovariaj preparaĵoj estas tute senutilaj, sed laŭ ROGER, DREYFUS, Guy LAROCHE ili povas esti iom utilaj ĉe menopaŭzo. Oni konsilis fortajn dozojn (SCHOTT, MUELLER, WEISSENBAĤ), longtempe donatajn (BURCKAERT). HUMBER aldone recepas hormonon de l'antaŭa parto

de la hipofizo; DREYFUS kune kun la ovariaj preparaĵoj donas fosfitan acidon aŭ jodon, SCHOTT, MUELLER piramidon. SCHLESINGER antaŭvidas necesa kelkfoje la ovarian grefton.

Tiroidodevena reŭmatismo. — Ĝia ekzisto estas ankoraŭ pli diskutita ol la ovariodevena. Estas tie ĉe hipotiroideco, tie hipertiroideco. Guy LAROCHE kaj ROGER rimarkigas ke reŭmatismo estas malofta ĉe miksedemuloj kaj ĉe Basedovmalsanuloj. STEVENIN ekzamenis reŭmatismulojn ĉe kiuj oni opiniis ke la reŭmatismoj estas el tiroida deveno; ilia metabolismo estis tute norma. Tamen laŭ LAROCHE oni devas ĉiam recepti la tiroidajn preparaĵojn, en kronikaj reŭmatismoj, ĉar ili estis kelkfoje utilaj (tion aliaj aŭtoroj neas).

Paratiroidodevena reŭmatismo. — Ĝi ekzistas laŭ multaj aŭtoroj (ĉefe P. MERKLEN). Kaze de pliigo de kalcio, LERICHE akiris bonan rezulton per unuflanka paratiroidektomio, ĉefe ĉe junaj individuoj. DREYFUS, WEISSENBACH, STEVENIN konsilas la uzon de paratiroidpreparaĵoj.

Hipofizodevena reŭmatismo. — Generale oni dubas pri ĝia ekzisto. Kaze de detruo de hipofizo oni nenion observas ĉe artikaro. Laŭ BURKARDT en tri kazoj de akromegalia kun artikaj difektoj la hipofizaj preparaĵoj ne agis.

Rolo de hepato. — En kelkaj reŭmatismoj la rolo de hepato estas certa (LEOPOLD LEVI, DREYFUS); PARTURIER kaj PARLIER referis pri kazoj de hepatdevena reŭmatismo.

Fine kelkfoje ambaŭ endokrinaj glandoj (aŭ plie) ŝajnas esti samtempe kulpigeblaj sed al la poliglandpreparaĵoj DAUSSET preferas la ĝeneralajn aplikojn de varmo, Hertzajn ondojn je 18 metroj k.t.p.

BRIQUET (Lille).

P. FRUCTIER. — Ĉu ekzistas familioj kies membroj estas emaj por esti trafitaj de difterio? (El *La Clinique*, déc. 1931.)

616. 931 -05

La aŭtoro jesas ĉar :

- 1) Estas individuoj kiuj estas plurfoje trafitaj de difterio.
- 2) Estas infanoj (3 ĝis 5 po 100) kiuj, malgraŭ la vakcinado per la kontraŭdifteria anatoksino, iĝas difteriuloj.
- 3) Estas familioj vere emaj al difterio. Zoeller (Pariza medicina societo de la hospitaloj 10-7-1931) raportis pri jenaj du kazoj :

Familio A : kvin infanoj : ĉiuj en malsamaj tempoj estis trafitaj de difterio. Je tiu epoko la seroterapio ne ekzistis. Du mortis, unu estas traheotomiita.

Familio B : kelkaj kazoj de difterio.

Filo A edziĝis kun filino B kiu estis antaŭe trafita dufoje de difterio. Liaj du infanoj iĝis difteriuloj, kvankam unu el ili estis injektita per anatoksino.

Oni ne povas diri ĉu tiu emo estas ĉeldevena, aŭ humordevena, t.e., kaŭzata de speciala stato de la fluidaĵoj de l'organismo.

Ĉe la infanoj, kiujn la normaj dozoj de anatoksino ne imunigas, oni povas injekti pli gravajn dozojn; kelkfoje ŝajnis ke la injekto de kontraŭtifoida vakcino fortigis la agon de la anatoksino antaŭe aŭ samtempe injektita.

BRIQUET (Lille).

I. WALC kaj I. KLIMKIEWICZ. — Pri kuracado de tetano per sero. (El *Medycyna*, 1931, n-ro 24.)

616. 946

En tri el la kazoj de tetano observitaj de la aŭtoroj, la inkubacia stadio estis iom longa (11, 13 kaj 14 tagojn); en la kvara, la plej grava, ĝi daŭris nur 7 tagojn. Ĉiuj saniĝis. Ju pli mallonga estas la inkubacio des pli gravaj la simptomoj. Por la kuracado, oni devas injektadi grandajn kvantojn da sero : ĉiutage ĝis ĉiutritage 40-160 cm³. Plej bonajn rezultojn donas la injektado en la spinan kanalon. La plej rapida resaniĝado efektiviĝas, se oni injektas la kontraŭtetanan seron dum samtempa perkloroforma narkotizigo de la malsanulo. Oni devas donadi la seron ĝis kompleta saniĝo de la vundo kaj ĝis malapero de ĉiuj simptomoj de la malsano. Se oni aplikas la seron envejn en aŭ en la spinon, oni devas uzadi nefenoligitan seron por eviti apneon kaj ŝokon.

BLASSBERG (Krakow).

DOMMESENT. — Resaniĝo ĉe du kazoj de grava tetano. (El *Journal des Sciences Médicales de Lille*, 21-2-1932.)

616. 946

La aŭtoro referas pri du kazoj de grava tetano, kiujn li resaniĝis dank'al la uzado de grandaj dozoj da kontraŭtetana sero kaj de kloralo. Ĉe la unua malsanulo li injektis 1270 ccm. da sero (envejn nur 140), kaj donis 113 gr. da kloralo kaj 0 gr. 24 da heroĥno, en 32 tagoj. Aperis iom gravaj seraj malagrablaĵoj, sed la resaniĝo rapide okazis.

Konklude, oni ne konsideru ĉiam mortiga la tetanon kaj ne timu recepti grandajn dozojn da kuraciloj.

BRIQUET (Lille).

I. KONIEKPOLSKI. — Pri malfrua aplikado de la kontraŭ-difteria sero. (El *Medycyna*, n-ro 19, 1931.)

616. 931 -085. 373

Laŭ la statistiko de la urba hospitalo por infektaj malsanoj en Czeszochowa oni observadis en la hospitalo, dum la jaro 1930, 35 kazojn de difterio kun mortaleco 20 %. En 13 kazoj oni devis fari la traĥeotomion kun mortaleco 84 % ĉe la operaciitoj. Inter la 35 malsanuloj estis 33 kristanoj kaj 2 hebreoj, 43 % knaboj kaj 57 % knabinoj. Ĉe la knaboj la mortaleco estis iom pli alta ol ĉe la knabinoj. Ankaŭ la statistiko por la nuna jaro estas simila. La malbona efiko estis kaŭzita pro tro malfrua aplikado de la sero, ĉar la malsanuloj devenadis ĉefe de la malprokisma ĉirkaŭaĵo kaj la sero povis esti enŝprucata nur en la 4a-6a tago post la ekmalsaniĝo. En 4 el la 9 eksterurbdevenaj kazoj la operacio devis estis farata. En

de la hipofizo; DREYFUS kune kun la ovariaj preparaĵoj donas fosfitan acidon aŭ jodon, SCHOTT, MUELLER piramidon. SCHLESINGER antaŭvidas necesa kelkfoje la ovarian grefton.

Tiroidodevena reŭmatismo. — Ĝia ekzisto estas ankoraŭ pli diskutita ol la ovariodevena. Estas tie ĉe hipotiroideco, tie hipertiroideco. Guy LAROCHE kaj ROGER rimarkigas ke reŭmatismo estas malofta ĉe miksedemuloj kaj ĉe Basedovmalsanuloj. STEVENIN ekzamenis reŭmatismulojn ĉe kiuj oni opiniis ke la reŭmatismoj estas el tiroida deveno; ilia metabolismo estis tute norma. Tamen laŭ LAROCHE oni devas ĉiam recepti la tiroidajn preparaĵojn, en kronikaj reŭmatismoj, ĉar ili estis kelkfoje utilaj (tion aliaj aŭtoroj neas).

Paratiroidodevena reŭmatismo. — Ĝi ekzistas laŭ multaj aŭtoroj (ĉefe P. MERKLEN). Kaze de pliigo de kalcio, LERICHE akiris bonan rezulton per unuflanka paratiroidektomio, ĉefe ĉe junaj individuoj. DREYFUS, WEISSENBACH, STEVENIN konsilas la uzon de paratiroidpreparaĵoj.

Hipofizodevena reŭmatismo. — Ĝenerale oni dubas pri ĝia ekzisto. Kaze de detruo de hipofizo oni nenion observas ĉe artikaro. Laŭ BURKARDT en tri kazoj de akromegalia kun artikaj difektoj la hipofizaj preparaĵoj ne agis.

Rolo de hepato. — En kelkaj reŭmatismoj la rolo de hepato estas certa (LEOPOLD LEVI, DREYFUS); PARTURIER kaj PARLIER referis pri kazoj de hepatodevena reŭmatismo.

Fine kelkfoje ambaŭ endokrinaj glandoj (aŭ plie) ŝajnas esti samtempe kulpigeblaj sed al la poliglandpreparaĵoj DAUSSET preferas la ĝeneralajn aplikojn de varmo, Hertzajn ondojn je 18 metroj k.t.p.

BRIQUET (Lille).

P. FRUCTIER. — Ĉu ekzistas familioj kies membroj estas emaj por esti trafitaj de difterio? (El *La Clinique*, déc. 1931.)

616. 931 -05

La aŭtoro jesas ĉar :

- 1) Estas individuoj kiuj estas plurfoje trafitaj de difterio.
- 2) Estas infanoj (3 ĝis 5 po 100) kiuj, malgraŭ la vakcinado per la kontraŭdifteria anatoksino, iĝas difteriuloj.
- 3) Estas familioj vere emaj al difterio. Zoeller (Pariza medicina societo de la hospitaloj 10-7-1931) raportis pri jenaj du kazoj :

Familio A : kvin infanoj : ĉiuj en malsamaj tempoj estis trafitaj de difterio. Je tiu epoko la seroterapio ne ekzistis. Du mortis, unu estas traheotomiita.

Familio B : kelkaj kazoj de difterio.

Filo A edziĝis kun filino B kiu estis antaŭe trafita dufoje de difterio. Liaj du infanoj iĝis difteriuloj, kvankam unu el ili estis injektita per anatoksino.

Oni ne povas diri ĉu tiu emo estas ĉeldevena, aŭ humordevena, t.e., kaŭzata de speciala stato de la fluidaĵoj de l'organismo.

Ĉe la infanoj, kiujn la normaj dozoj de anatoksino ne imunigas, oni povas injekti pli gravajn dozojn; kelkfoje ŝajnis ke la injekto de kontraŭtifoida vakcino fortigis la agon de la anatoksino antaŭe aŭ samtempe injektita.

BRIQUET (Lille).

I. WALC kaj I. KLIMKIEWICZ. — **Pri kuracado de tetano per sero.** (El *Medycyna*, 1931, n-ro 24.)

616. 946

En tri el la kazoj de tetano observitaj de la aŭtoroj, la inkubacia stadio estis iom longa (11, 13 kaj 14 tagojn); en la kvara, la plej grava, ĝi daŭris nur 7 tagojn. Ĉiuj saniĝis. Ju pli mallonga estas la inkubacio des pli gravaj la simptomoj. Por la kuracado, oni devas injektadi grandajn kvantojn da sero : ĉiutage ĝis ĉiutritage 40-160 cm³. Plej bonajn rezultojn donas la injektado en la spinan kanalon. La plej rapida resaniĝado efektiviĝas, se oni injektas la kontraŭtetanan seron dum samtempa perkloroforma narkotizigo de la malsanulo. Oni devas donadi la seron ĝis kompleta saniĝo de la vundo kaj ĝis malapero de ĉiuj simptomoj de la malsano. Se oni aplikas la seron envejn en aŭ en la spinon, oni devas uzadi nefenoligitan seron por eviti apneon kaj ŝokon.

BLASSBERG (Krakow).

DOMMESSENT. — **Resaniĝo ĉe du kazoj de grava tetano.** (El *Journal des Sciences Médicales de Lille*, 21-2-1932.)

616. 946

La aŭtoro referas pri du kazoj de grava tetano, kiujn li resaniĝis dank'al la uzado de grandaj dozoj da kontraŭtetana sero kaj de kloralo. Ĉe la unua malsanulo li injektis 1270 ccm. da sero (envejn nur 140), kaj donis 113 gr. da kloralo kaj 0 gr. 24 da heroino, en 32 tagoj. Aperis iom gravaj seraj malagrablaĵoj, sed la resaniĝo rapide okazis.

Konklude, oni ne konsideru ĉiam mortiga la tetanon kaj ne timu recepti grandajn dozojn da kuraciloj.

BRIQUET (Lille).

I. KONIEKPOLSKI. — **Pri malfrua aplikado de la kontraŭ-difteria sero.** (El *Medycyna*, n-ro 19, 1931.)

616. 931 -085. 373

Laŭ la statistiko de la urba hospitalo por infektaj malsanoj en Czeszochowa oni observadis en la hospitalo, dum la jaro 1930, 35 kazojn de difterio kun mortaleco 20 %. En 13 kazoj oni devis fari la traŭtomion kun mortaleco 84 % ĉe la operaciitoj. Inter la 35 malsanuloj estis 33 kristanoj kaj 2 hebrea, 43 % knaboj kaj 57 % knabinoj. Ĉe la knaboj la mortaleco estis iom pli alta ol ĉe la knabinoj. Ankaŭ la statistiko por la nuna jaro estas simila. La malbona efiko estis kaŭzita pro tro malfrua aplikado de la sero, ĉar la malsanuloj devenadis ĉefe de la malprokisma ĉirkaŭaĵo kaj la sero povis esti enŝprucata nur en la 4a-6a tago post la ekmalsaniĝo. En 4 el la 9 eksterurbdevenaj kazoj la operacio devis esti farata. En

la aĝo de 1-2 jaroj, la trakuro de la diferio estis la plej malica. La benigna trakuro ĉe la hebrea loĝantaro ekestis nur tial ke ili tre frue vokadis kuracistojn kaj la ĝusta persera kuracado estis pli frue aplikata. La aŭtoro atentigas, ke sole la plej eble frua uzado de sero donadas bonajn efikojn. Ankaŭ li substrekas la bezonon de granda kvanto da sero, kiu estu aplikata konforme kun la grado de toksigo sed ne laŭ la aĝo de la malsanulo. La sero devas esti daŭrigata ĝis kiam malaperis la gravaj malsansimptomoj.

BLASSBERG (Krakow).

P. O. PRIBAM (Berlin). — **La patologia signifo de la sanganta mamo.** (El *Med. Klinik*, n-ro 51, 1931.)

618. 19 -005. 1 -62

Sangado en la mamo preskaŭ ĉiam signifas estiĝon de kisto en la mamo, komunikanta kun la ĉefa lakta dukto, sed ne estiĝon de tumoroj kaj precipe ne de kancero. Fermitaj mamkankroj t. e. ne penetrantaj tra la haŭto preskaŭ neniam sangas. Tial do sangado el mamo ne estas konsiderinda simptomo de kancero. Ĉefe la sangado en la mamo sekvas en jam faritajn kistojn kaj se la kisto komuniĝas kun la ĉefa dukto, okazas sangado el la mampinto. Neniam oni povas deklari la sangadon kiel diagnozan signon de maligna tumoroj kaj sangado ĉe fermita mamkrankro estas maloftaĵo. En plej multaj kazoj la kaŭzo de la sanganta mamo estas kistepteliomo; eta tumoroj sidanta en kista plivastiĝo de pli granda lakta kanalo. Ĝi prezentas ian perigilon inter mildaj kaj malignaj tumoroj, montranta neniam emon al recidivoj aŭ metastazoj. La aŭtoro observis post multjara observado en neniam kazo aperon de recidivo, kvankam li faris neniam radikalan amputacion de la mamo kun forigo de la glandoj, sed kontentigis ĉiam nur je eltranĉo de la mamo mem. Tiu ĉi moderata ĥirurgia vidpunkto estas tiom pli rajtigata, ĉar la malsano atakas ĉefe junajn virinojn, ĉe kiuj la kistema mamo aperas eĉ ofte ambaŭflanke. Tial sufiĉas ĉiam operacio konservativa, konsistanta el fortranĉo de la mamo sen eligo de la glandoj. Sed en ĉiu kazo konstanta kontrolo de tiaj virinoj restas grava devo de konsilanta ĥirurgo.

FELS (Lwow).

COURMONT kaj SEDALLION (Lyon). — **Epidemio de puerpera febro, kaŭzata de unu sama streptokoko de faringo deveno.** (El *Presse Médicale*, 1931, n-ro 72.)

618.7 -002

Kiel kaŭzo de epidemia puerpera febro montriĝis akuŝistino, kiu post preteririnta angino, de la kuracisto estis deklarata sana kaj denove plenumis sian metion. El 11 naskoj 6 akuŝintinoj ricevis puerperan proceson, kies devenon la tre singardema kaj konscienca akuŝistino ne povis al si klarigi. Nur post longaj precizaj esploroj bakteriologiaj montriĝis, ke la sama, tute ne febra akuŝistino estis disportantino de streptokokoj en faringo kaj de tie venis la puerperaj infektoj.

FELS (Lwow).

La Profita

Kuracilo de malfortigoj ĉe suĉinfanoj

(dispepsio, distrofio, atrofio, malkomponiĝo, frunaskoj, k.t.p.)

LITERATURO : *Finkelstein, Langstein, L. F. Meyer, E. Müller, Schlossmann, Feer, k.m.a.*

Nutriga rimedo dum resanigo

ĉiuspeca : post operacioj, sangoperdo, febro, ĉe nasko, mamnutro, denutrado, stomak- kaj intestsuferoj, anemio, diabeto, k. t. p.

LITERATURO : *Hofmann, Praussnitz, Caspary, Bickel, Rubner k. m. a.*



PLASMON-Laktalbumino

Analizo : 76% albumino, 2.5% kalko, 3% fosfata acido.

Biologie plenefika albumino

Literaturo kaj specimenoj laŭdemande.

PLASMON-GESELLSCHAFT m.b.H., Neubrandenburg Mecklb. Germanujo.

Certa Ŝpariga

estas « SAGROTAN », la nuntempa desinfektilo kun agra-blaodoro kaj plej forta bakteri-mortiga kapablo; tute ne domaĝa, speciale ŝpariga je uzo ĉar en kazoj kiel akuŝoj, ĝi estas uzata en nur 1/2 %a solvaĵo; speciale dediĉata al desinfektado de manoj kaj instrumentoj, ankaŭ al akuŝarto kaj ginekologio.

En Germanujo per ministeriaj decidoj rekomendita por la akuŝarto.

“SAGROTAN”

(registrita marko).

Specimenoj kaj literaturo senpage de

SCHÜLKE & MAYR Aktien-Gesellschaft, Hamburg 39 (Germanujo)

Kripke

Zink-Schwefel-Mattan

laŭ UNNA

nevidebla grasa unĝento

ankaŭ

por

Mattan
Schwefel-Mattan
Zink-Mattan
Teer-Mattan
Ichtyol-Mattan
Salicyl-Mattan
Gletscher-Mattan
Tumenol-Mattan

okuloj-vizago-manoj

ne difektanta
resaniganta

Kripke, Dr. Speier & Co.,

Berlin (Germanujo) Admiralstr. 18 E

Universala Esperanto - Asocio

CELAS:

Dispagti la uzadon de la internacia helpingvo Esperanto.

Plifaciligi la ĉiusepacajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco, religio aŭ lingvo.

Krei internaciajn servojn uzeblajn de ĉiuj homoj, kies intelektaj aŭ materiaj interesoj celas trans la limojn de ilia genta aŭ lingva teritorio.

Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco kaj disvolviĝi ĉe ili la komprenon por fremdaj popoloj.

La Asocio estas neŭtrale riata al religio, nacieco aŭ politiko.

DONAS:

Al la membroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpaĝan Jarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, Esperantistaj grupoj, gazetoj, organizaĵoj, kun sciigoj pri internaciaj rilatoj k.t.p.

Al la Membro-Abonantoj: Krom tio la gazeton « Esperanto », internacia ĉeforgano de la Esperantistoj, kun artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj informoj pri la movado.

Al la Subtenantoj: Krom ĉiuj dokumentoj, kiujn ricevas Membro-Abonanto, premion konsistantan el la Esperanto-literaturo.

Ĉiu aliginto rajtas presigi senpage korespondan anoncon unufoje en la gazeto « Esperanto ».

kaj postulas nur modestan kotizon de 5 Fr. por Membro, de 12,50 Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por Membro-Subtenanto.

Universala Esperanto - Asocio
1, Tour de l'Île. Genève (Svislando)

**Arteriosklerozo,
Reŭmatismo,
Podagro,
Vezikacida diatezo,
Neŭrastenio**

Radiosclerin



Hejma Radium-Trinkkuracado
1-2 premaĵoj, solvitaj en vinglaso da akvo, havigas ĉiam freŝan mineralakvon.

Sen alia recepto : uzota trifoje ĉiutage laŭ tiu maniero.

Detala literaturo kaj specimenoj por kuracistoj haveblaj de

RADIOSCLERIN, G.m.b.H.

Berlin S. W. 68..

Alexandrinenstr. 26, Germanujo

Kupono :

Peto alsendi literaturon kaj specimenojn

Nomo

Urbo

Strato

Lando

DIVERSAJOJ

VEGETARISMO AU TRADICIA DIETO?

(Resumo de artikolo de D-ro FAFNER en *Bruxelles-Médical*,
represita en *Echo Médical du Nord*, 3-10-1931.)

La adeptoj de vegetarismo (forgesintaj verŝajne ke dum la lasta militado, la saneco de multaj individuoj en Germanujo kaj en la landoj okupitaj de la germanaj armeoj, tre malboniĝis pro manko de viando kaj de bestdevenaj grasaĵoj) denove sin movas por publike rekomendi la ekskluzivan manĝadon de vegetaĵoj. Jen ilia argumentaro :

La norma nutrado de la homo, ĉe komenco de la mondo estis vegetaĵa; la homa korpa kondiĉaro estas simila al la korpa kondiĉaro de la fruktomanĝantaĵ bestoj; la vegetaĵoj entenas ĉiujn nutrigajn elementojn necesajn, pli malmultekostajn ka pli sanigajn ol la ditajn elementojn eltiratajn el viandaĵo.

Cu vere la unuaj homoj vivis nur el vegetaĵoj? Ne, ili estis ĉasis-toj kaj manĝis viandon; la iamaj fruktoj, cerealoj, legomoj ne estis la malsovaĝaj kiujn ni uzadas, kaj tiutempe ili ne estis taŭgaj, sufiĉe nutrigaj.

Cu vere la homa korpa kondiĉaro estas nur tiu de fruktomanĝanto? Tute ne, kaj estis ofte pruvita ke la homo estas ĉionmanĝanto.

La plej multaj adeptoj de vegetarismo permesas lakton, ovojn; ĉu ili ne estas bestdevenaj?

Pri la grasaĵoj, ĉu sufiĉas por la organismo la grasaĵoj de la lakto (butero) aŭ de la margarino (oleo de kokoso, k.t.p.)? Ne, sed la belga laboristo trovas en la viando la necesan pliaĵon (la fibroj de besta muskolaro entenas kelkfoje 23 % da grasaĵo), ankaŭ en la lardo, en la porkograso.

Oni diras ke la viando povas liveri al la organismo toksajn produktaĵojn, sed ĉu ne same la fromaĝoj derivitaj de la lakto, ĉu ne same la konservitaj ovoj?

Alia argumento estas ke la monaĥoj manĝas nur vegetaĵojn. Jes, sed kiam ili iĝis monaĥoj ilia kreskado estis tute finiĝinta; dum sia kreskado ili profitis el la tradicia dieto (viando, k.t.p.).

Oni diris ankaŭ ke la admirinda japana soldato kiu venkis la ruson estis nura vegetaĵmanĝanta, sed D-ro Matignon (*Revue Scientifique*, 27-8-1910) certigis ke la japana soldato ĉiam manĝis viandon kaj fiŝon.

Oni diras ke la legomoj (pizoj, fazeoloj, lentoj) entenas pli da proteinoj ol la viando; ĥemie, vere, sed fiziologie multe pli granda, multe pli facila estas la asimilado de la viandaj proteinoj.

Same pri la fruktoj, ekz., la banano nur entenas iom da sukerglikozo, iomete da proteinoj, preskaŭ neniom da vitaminoj. Cu malmultekoste? Ne ĉar la sukero de banano kostus po 100 frankoj por kilogramo.

Pri la viando oni diras : ĝi ne estas kompleta alimento; ĝi ne estas dinamogena kiel la hidrokarbidoj, fekuloj, sukeroj. Kompleta ne, sed ĝi estas uzata samtempe kun aliaj alimentoj. Ĉu estas kompleta alimento la sukero? la butero, k.t.p?

Oni diras ke la viando povas transdoni tuberkulozon, triĥinon tenion k.t.p. La polico estas komisiata por prigardi pri vendado de bonstata viando. Plie ĉu la lakto ne povas transdoni tuberkulozon?

Oni diras que la viando estas toksiga per siaj purinoj kaj ke ĝi acidigas niajn humorojn. Tre certe oni ne manĝu tro da viando, sed oni ne forgesu ke ankaŭ la legomoj, la ĉokolado, la kafo entenas purinojn; la cerealoj kaj kelkaj vegetaĵoj povas ankaŭ favori al la acideco de la humoroj.

La argumento de la vegetarismadeptoj pri la vitaminoj ne estas pli firma ol la aliaj, ĉar en la tradicia dieto la vitaminoj ne mankas; la varmigo je 100° ne detruas la vitaminojn A, B, D, sed nur la vitaminon C.

Oni diras que la viando multe kostas, sed ĉu tamen en ĉiuj armeoj oni ne juĝis ĝin necesa malgraŭ ĝia prezo; ankaŭ la kuracistoj ĝin konsilas al ĉiuj resaniĝantoj. P-ro Carnot skribis : « La bestaj albuminoj estas preferindaj al la vegetaĵaj ĉar dum digestado ili liveras serion da aminaj (F. *aminés*) acidoj faciligantaj la regeneradon de la teksajaj albuminoj al kiuj ili estas similaj. La enstomakigo de besta muskola albumino estas pli taŭga ol tiu de rizo aŭ de gluteno kiuj ne entenas la aminajn acidojn postulatajn. Krome la bestaj teksaĵoj posedas stimulan econ speciale utilan, oni pripensu la valoron je tiu vidpunkto de la viandekstraktaĵoj, aŭ de kelkaj endokrinaj glandoj. »

Oni povas konkludi ke la vegetarismadeptoj ĝis nun ne proponis sufiĉajn argumentojn por ke la plej multaj homoj rezignu sian tradician dieton.

BRIQUET (Lille).

.....

NOVAĴETOJ.

BRAZILO. — En *Revista de Associação Paulista de Medicina*, aperanta en São-Paulo, n-ro 6 de 1932, ni trovas recenzon de la **TEKNIKA MEDICINA VORTARO** de Briquet, subskribita de D-ro Barbosa Correa. La recenzo estas favora por la libro « nepre necesa por klinikistoj, interesigantaj pri helplingvo Esperanto ». Dankon!

ĤINUJO. — En Sanhajo estis fondita Sanhaja Esperantista Ligo, kiu jam starigis korespondan esperanto-kurson, migrantan instruistan grupon, esperanto librejon, kaj eldonas ilustritan monatan gazeton « La Mondo ». Ni esperas bonan sukceson al la nova Ligo! Adreso : P. O. Box 274, Sanhajo, Ĥinujo.

POLUJO. — D-ro W. ROBIN, Varsovio, estas reelektita vicprezidanto de Pola Gastrologia Societo.

— D-ro W. ROBIN, Varsovio, estas elektita vicprezidanto de Loka Kongresa Komitato, aranĝanta Vian Tutpolan Esperantan Kongreson en Varsovio la 3an de junio 1933.

**VARIKOJ — FLEBITOJ — HEMOROIDOJ
CIRKULADAJ MALORDOJ — HIPERTENSIO
KONĜESTAJ STATOJ DE LA MENOPAŬZO**

HAMAMELIODE

(*Malŝanĝema Kombinaĵo de Jodo Kaj Hamamelo*)

X gutoj da Hamameliode entenas ekzakte 0,01 da Jodo tute kombinata kun 0.25 da ekstrakto je egala pezo da vegetaĵo.

Dozoj: 30 ĝis 50 gutojn potage, en du aŭ tri fojoj.

Laboratorio OBERLIN, 17, rue Cadet, Parizo
J. TINARDON, unuaklasa apotekisto el Altiernojo de P rizo.

POR KONTRAŬDOLORA Batalo

Terucyl

kontraŭ

Reŭmatiko - Membrodoloroj

Isĥiatika neŭralgio

Avantaĝoj : Rapida penetrado en la haŭto sen alia dolorincito per masaĝo.

Fidinda kaj daŭra ĝisfunda efiko.

Komerc.-formo : En tuboj.

Prezo : RM. — 75.



Citrovanille Otto

kontraŭ

Neŭralgioj - Migreno
Nervodoloroj

Avantaĝoj : Fidinda, rapida agado sen kor- aŭ stomak-malopordunaj. Granda terapeŭtika kampo, neniu amasiĝdanĝero. Ankaŭ kontraŭ post-operaciaj doloroj.

Komerc.-formoj : en oblatoj kaj en pulvoroj.

Prezoj : 12 oblatoj, RM. 1.10.
6 pulvoroj, RM. 1.10.

Literaturo ricevebla pere de administracio de la gazeto aŭ de la sola preparanto OTTO & K^{to}, Frankfurt a. M. S. 10 (Germanujo).

TEKNIKA MEDECINA VORTARO

verkita de D-ro BRIQUET

360 paĝoj

Prezo, bindita : 2 usonaj dolaroj aŭ 14.40 belgoj (72 belgaj frankoj)

D-ro Bernard KAPELNER

ordinacias por internaj malsanoj	
MERANO Andrea Hofer, 1 de la 1a de Oktobro ĝis la 1a de Majo.	MARIENBAD Weisser Schwan de la 1a de Majo ĝis la 1a de Oktobro.

MONTECATINI Terme

Malsanoj de la hepato, stomako, intestoj kaj de la asimilado.

Saniga klimato. — Belaj ĉirkaŭaĵoj. — Modernaj kuracejoj.

Parko 50.000 kv. m. granda. — Aleoj 50 km. longaj.

TEATRO — KAZINO — LAŬNTENISO — VETKUREJO.

HOTEL BELLA - VISTA - A. Palace

Bela palaco en propra ĝardeno. — Plena komforto.

— Centra hejtinŝtalaĵoj. — Kurackonforma nutraĵo.

Fratell : **C. NUTI**, mastro kaj administranto.

D-ro Aleksandro GOLDSCHMIED

est. kuracisto de vienaj klinikoj
ord. kiel ĉiujare en internaj kaj urinvoĵaj malsanoj
en **MORSZYN (Morŝin) Polujo** **Pensiono « Felicia »**

PERUGEN (Dro. EVERS)

(Artefarita Peru-Balzamo)

Longe provita vundkuracilo, specifa kontraŭ

PARAZITAJ MALSANOJ

Originalaj boteloj entenantaj 30, 50, 100, 250 gramojn.

HEMIA FABRIKO REISHOLZ, G. M. B. H., Duesseldorf-Reisholz
(Rejnlando)

D-ro Marcelo ELIASIEWICZ

ord. kiel ĉiujare por internaj kaj ŝtofinterŝanĝaj malsanoj.
en **TRUSKAWIEC (Polujo)** **Vilao : « Jadwinowka »**

PRI LA ECOJ DE LA « ŜTONO F. V. »

La Direkcio de « *l'Opera Domus Nostra* », en Venecio, pri scienco, literaturo kaj belartoj, kies honora Prezidanto estas Charles Richet de la Pariza Sorbono, sciigas ke ĝia Ĝenerala Direktoro P-ro Luigi Bellotti (Luigi da Venezia) direktoro de la fako pri esploroj kaj studoj radiomineralogiaj de la scienca sekcio, ĵus faris tre interesan sciencon eltrovon, rigore kaj skrupule kontrolita de sciencaj kompetentuloj kaj poste de tiuj ĉi konfirmitaj, pri praktikaj aplikadoj de materiaj radiadoj.

Tiu ĉi eltrovo rilatas nome iun mineralon, eltiritan el preskaŭ sescent metroj profunde, kiu, en sia natura stato, enhavas terapeŭtikajn, higienajn, radioaktivajn kaj baktericidajn ecojn, ankaŭ je distanco, sen kontakto, kaj ankaŭ aliajn ecojn kaj virtojn, analogajn al tiuj de la radiumo, sed sen malhelpaĵoj kaj danĝeroj de tiu ĉi. Krome oni konstatis ke ĝi efikas ankaŭ kiel regeneranto kaj vitaliganto de ĉiuj organoj, ankaŭ en la plej malfrua aĝo.

La spertoj, plenumitaj nur kun scienca celo, donis pozitivajn rezultojn po 90 %.

Sekvas tre ampleksa referato de P-ro Bellotti, titola « *Dalle Ande alle Alpi* » (De la Andoj ĝis la Alpoj) *pri ŝtono, kiu mortigas mikrobojn, ankaŭ je distanco, sen kontakto; kaj kiu, en sia stato, entenas analogajn ecojn de la radiumo, sendanĝere, kaj kiu regeneras kaj vitaligas ĉiujn organojn; sed mi opinias ke ne estas nun taŭge traduki tiun ĉi ampleksan referaton, dum oni daŭre pristudas en diversaj sciencaj ejoj, tiun gravan aferon; pro tio mi min limigas elĉerpi tien kaj reen la plej notindajn sciigojn.*

P-ro Bellotti referas ke li ricevis la ŝtonon nomitan F. V. la unuan de Aŭgusto 1932 (ero de 17 gramoj). Li tenis kaj streĉis ĝin en sia manplato kaj tuj rimarkis sentojn de varmo, forto, kaj radiadoj, kiu produktis formiksentojn.

Hazarde li surmetis la ŝtoneron sur fotografaĵo, kuŝanta sur lia skribotablo, apartenanta al iu malsanulino, kiu suferis 5 aŭ 6 epilepsiajn atakojn ĉiutage.

Post unu semajno, li sciigis ke aperis nur unu atako potage, sed ne ĉiam. Tiu ĉi hazarda sperto vekis tuj la atenton de P-ro Bellotti, kiu intense ripetis multnombrajn similajn spertojn, ĉiam kun positiva rezulto.

Iu inĝeniero mineralogisto de Parizo, kiu pristudis la ŝtonon F. V. fizike, skribas jenon : « *La mineralo, al mi sendita, eligas ondojn radioaktivajn horizontalajn kaj aliajn vertikalajn. Tiuj ĉi ondoj estas penetrantaj kaj havas saman econ de tiuj de la radiumo. La radiuma ondo longas 1 m. 55, dum tiu de la mineralo 1 m. 45. En tiu ĉi mineralo oni trovas ĉeeston de du korpoj de la tabelo de Mendeleef : kupro n-ro 29 kaj lutecium n-ro 71.* »

Iu bakteriologo, ano de la Reĝa Akademio de Belgujo, referas jenon : « *Oni prenis tri tubojn, kun kulturo de patogenaj mikroboj : oni lasis evoluigi la kulturon kaj poste oni ŝtopis ilin per vato, kaj oni surmetis sur du eron da ŝtono F. V. Post 24 horoj, oni ekzamenis la tubojn. La tubo sen ŝtono estis plenplena de virusaj mikroboj : en la du aliaj, la kulturo malmulte prosperis. Ĉe la tria tubo oni lasis*

la ŝtonon sur la vato dum aliaj 24 horoj; post kio la kolonio de patogenaj mikroboj estis tute detruata. La mikrobicida ago de la ŝtono F. V. estas do science kaj nepre starigata. »

Oni konstatis ke la ŝtono, se oni ĝin portas sur si mem, dum kelka tago, regeneras kaj vitaligas ĉiujn organojn, ankaŭ la seksajn, en la plej malfrua aĝo; do redonas virecon.

Trad. kaj res. D-ro D. PACE (La Spezia).

FAKVORTARA DISKUTEJO

Respondo al kelkaj kritikoj :

A. H. W. en *The British Esperantist*, decembro 1932, riproĉas al nia Teknika Medicina Vortaro :

1) multajn *senutilajn vortojn*. Ekz. : *Insuficienco*. Mi lasis tiun vorton ĉar kelkaj kolegoj uzadis ĝin sed mi preferas *nesufiĉeco* kiun mi uzis sole ĉe la vortoj *mitrala* (N-ro 2239), *aorto* (N-ro 282), k.t.p. Ekz. : *Hekzakanta*. Tute prave, *seshoka* sufiĉas.

2) multajn *sinonimojn*. *Omfalo* kaj *umbiliko*, *epiploo* kaj *omento*, k.t.p. Ambaŭ vortoj ŝajnas al mi samvaloraj kaj mi ne volis preni sur min la taskon definitive elekti. *Hlorozo* kaj *klorozo* (ĉiam renoviĝanta diskuto pri *h* kaj *k*). *Hidrargo* kaj *Merkuro*; mi lasis *merkuro*, sed mi notis pref. *hidrargo*.

3) *erarojn*. *Herpeso* anstataŭ *herpeto* ĉe vorto 3672, *talĥikardio* anstataŭ *talĥikoreco* ĉe vorto 3340... Tute prave. Dankon.

4) *novajn vortojn* kiuj anstataŭas jam uzatajn vortojn. Ekz. : *Parotido* anstataŭ *paroto*. Ĉu tiu kritiko estas grava? Nek *paroto*, nek *parotido* ekzistas en *Anatomia Vortaro* de Bouchard, en la nova *Plena Vortaro* de Grosjean-Maupin... En la *Plena Vortaro* de Boirac *parotido* ekzistas (L. kaj Gr. *Parotis*, Angl. *Parotid gland*, F. et H. *Parotide*, I. *Parotida*). Estus utile al mi ricevi la opinion de kelkaj fremdaj kolegoj; persone mi preferas *parotido*, sed *paroto* estas pli mallonga, tute egale logika, ĉu pli uzita ĝis nun mi ne opinias, kontraŭe.

KURACISTOJ KAJ LOĜANTARO

Jen, por diversaj landoj, la nombro de la loĝantoj por *unu* kuracisto :

Aŭstrujo	837	Palestino	1333	Luksemburgo	1666
Hispanujo	1000	Danlando	1346	Urugvajo	1666
Kanado	1066	Estonujo	1411	Portugalujo	2333
Anglujo	1069	Nederlando	1417	Svedujo	2660
Hungarujo	1100	Dantzig	1428	Brazilo	2666
Svislando	1140	Belgujo	1460	Rumanujo	2879
Greklando	1166	Latvujo	1461	Bulgarujo	2900
Kubo	1170	Norvegujo	1555	Polujo	3100
Germanujo	1237	Francujo	1596	Jugoslavujo	3459
Usono	1326	Ĉeĥoslovakujo	1666		

Atentu!

La abonoj komencas de n-ro 1 (januaro).

Abonprezo por unu jaro: *unu usona dolaro* aŭ ekvalenta sumo. Sendo de almenaŭ *tri dolaroj* rajtigas ricevon de *luksa eldono*.

Dumviva membro de T. E. K. A. ricevas luksan eldonon de I. M. R. kaj ĉiujn ĝiajn eldonaĵojn. Kotizo: dudek kvin usonaj dolaroj.

Kiel aboni?

En GERMANUJO, la abonojn enkasigas D-ro RENKEN, Häfen 26, Bremen.

En POLUJO, oni pagu la abonprezon al D-ino MUSZKATBLAT, Krochmalna, 15, Warszawa.

En JAPANUJO, oni pagu la abonprezon (3.50 japanaj jenoj) al D-ro URA — RYOOZI, Eskulapida Klubo, Anatomia Instituto, Imperia Universitato de Tokio, TOKIO.

El ĈIUJ ALIAJ LANDOJ, oni pagu senpere al la ADMINISTRACIO de I. M. R. ĉu per internacia poŝtmandato, ĉu per sendo de unudolara monbileto (aĉetebla en ĉiu lando ĉe monŝanĝisto) en registrita letero.

La posedantoj de poŝtekkontoj en Aŭstrujo, Belgujo kaj Belga Kongolando, Ĉeĥoslovakujo, Danujo, Danzigo, Francujo, Germanujo, Hungarujo, Italujo, Japanujo, Jugoslavujo, Latvujo, Luksemburgo, Maroko (krom la hispana teritorio), Nederlando, Polujo, Svedujo, Svisujo. povas pagi per internacia ĝiro al nia poŝtekkonto n-ro 2814.51 en Bruselo. Ĝi estas plej simpla, malmultekosta kaj tempoŝpara pagmaniero.

Kiel kvitancon, la Administracio tuj sendos membrokarton.

La Administracio.

ALIĜILO.

Resendota al administracio de I. M. R., 19, avenue Montjoie, Uccle 3 (Belgujo).

Mi aliĝas al T. E. K. A. kaj deziras ricevi I. M. R. dum la jaro 1933 (ordinara-luksa eldono).

Mi deziras ricevi ekzemplero(j)n de la Teknika Medicina Vortaro.

Mi sendas : (1) ĉi kune — samkuriero

mian jarabonon (1) — ... **usona(j)n dolaro(j)n** — (1) aŭ ekvalentan sumon, t. e. ... al (1) Administracio de la I. M. R. — D-ino Muszkatblat, Warszawa — D-ro Ryoozi URA, Tokio — per (1) monbileto — poŝtmandato — poŝta ĝiro sur belgan poŝtekkonton n° 2814.51 de Internacia Medicina Revuo, Bruxelles — poŝta ĝiro sur polan poŝtekkonton 12.651 de D-ino Muszkatblat, Warszawa.

(1) *Forstreku ne konvenajn indikojn.*

Nomo : Autaŭnomoj :
(*substreku la ĉefan*)

Profesio :
(*se eble, aldonu vian specialan fakon*)

Universitataj titoloj :

Adreso :

Strato : N°

Loko Provinco, Departemento :

(*urbo, vilaĝo, ktp*) :

Lando : Mondparto :

Dato :

Subskribo :

.....

.....

**Sensacia estas la
nova serio de**

OOMOTO INTERNACIA!

50 grandformataj pagoj 20 × 27 cm.

por febr.-marto! Sensacia artikolserio
de la poeto-Esperantologo Julio BAGHY
pri la grava problemo de l'neologismoj!

Valoraj kontribuajoj de ĉiunaciaj
eminentaj Geesperantistoj!

**Abonkotizo 1 dol. usona; mendu ĉe
OOMOTO CENTRA OFICEJO,
Kameoka Kioto-hu, Japanujo.**

LETERKESTO.

Al niaj legantoj. — Ni prezentas al nia legantaro la kvaran kajeron de nia gazeto por la jaro 1933. Malgraŭ ĉiuj malhelpaĵoj, ni sukcesis ĝis nun daŭrigi ĝian eldonadon. Forte kuraĝigis nin la aproboj kaj gratuloj ricevitaĵ, sed ni insistas por ke ĉiuj amikoj, kiuj ĝis nun ne repagis sian abonon, sendu ĝin tuj al sia landa kasisto aŭ al la adreso montrita sur la koverto. La nerepagintoj ne plu ricevos regule la gazeton.

Niaj korespondantoj bonvolu pripensi, ke la monata eldonado de la gazeto multe pliampleksigis la laboron de la redaktoro kaj ke, kvankam tutan sian liberan tempon ekster la profesia laboro li dediĉas al la gazeto, li nevole prokrastigis respondon al pluraj korespondantoj. Li petas ilian afablan pardonon kaj esperas baldaŭ enordigi ĉiujn malfruigintajn aferojn.

Niaj kolegoj, kiuj estas pretaj kunlabori en la redakcio, bonvolu sin anonci.

VETERINAROJ! — S. Boev, Veterinar-Bakteriolog. Instituto, Puŝkinska, 75, Alma-Ata (Mez-Azio), deziras korespondi pri helmintologio kaj aliaj medicinaj temoj; ege bezonas germanlingvajn verkojn pri parazitologio kaj deziras ilin ricevi kontraŭ sovetaĵ pre-saĵoj, fotoĵoj, k.t.p., je la sama valoro.

NEKROLOGO

P-ro POKOTILO. — Per reveno de sendita gazeto, ni sciigis pri la morto de P-ro Pokotilo, de la Ĥirurgia Fakultata Klinik, en Odessa. RED.

J. M. WARDEN. — Ni ĵus ricevis sciigon pri la granda perdo por la tuta esperantistaro. Mortis nia plej kara Prezidanto de Esperantista Akademio, Sinjoro John-Mabon WARDEN unu el plej fidelaj adeptoj de la Esperanto-Lingvo kaj Ideo.

J.-M. Warden de la komenco estis plej favora aganto por la disvastigo de la grandioza Zamenhofa Verko. Li ĉeestis ĉiujn senescepte esperantistajn Kongresojn; ĉie li kunagis kaj oftege subtenis la aferon morale kaj mone; li oferis preskaŭ la tutan sian vivon por amata de li invento de gravega signifo por la tuta homaro.

Mi konis lin jam delonge; depost la oka Universala Kongreso en Krakow. Miaj sentoj por la kara mortinto estis plej sindonaj kaj plej profundaj, ĉar li estis tute ne kutima homa estaĵo. Vere ne multaj similas al li. La amo kaj oferemo por la ideo estis en li superhomaj. Des pli granda estas nia perdo.

Al la Brita Esperanto-Asocio mi esprimas mian plej sinceran kompaton.

(El Pola Esperantisto.)

O. BUJWID.

FONDO DE INTERNACIA KOMITATO POR ESPORADO KAJ KONTRAŬBATALADO DE CIRKULADAJ PERTURBOJ

Unua regula kunveno en Bad Nauheim.

Okaze de la 6-a kunveno de la germana societo por cirkuladesploro en Würzburg (Bavaro), la komitato, starigita en Aprilo 1931 en la Kerkhoff-Instituto de Bad-Nauheim, celinta la esplorado kaj kontraŭbatalado de cirkuladaj perturboj, estas fondita kiel *Internacia Komitato por esplorado kaj kontraŭbatalado de cirkuladaj perturboj*.

La fondiĝo, en kiu aperis ĉirkaŭe 60 delegitoj de la en- kaj eksterlando, inter ili ankaŭ Ameriko, estis okazigata de la prezidanto de la regna higienoficejo, S-ro sekr. regist. konsilisto D-ro Hamel. Laŭ propono de la Amerikanoj por la unua regula kunsido de la komitato — je la fino de junio 1934 — estis destinata la Kerkhoff-instituto en Bad Nauheim. Al la amerika komitato oni prezentos la honoran prezidantecon de ĉi tiu unua kunsido.

Tiu internacia scienca kunlaborado estas plej grava por la batalo kontraŭ la cirkuladaj malsanaj de jaro al jaro pli ruinigaj.

Trad. BLUTH (Bad Neuenahr).

.....

BRUSELAJ MEDICINAJ TAGOJ

La XIIIa kunsido de la bruselaj medicinaj tagoj okazos de la 24a ĝis la 28a de junio 1933, kun la alta patronado de Ilija Gereĝaj Moŝtoj; P-ro Valère COCQ prezidos. Pro la granda valoro de la scienca kunlaborantaro kaj pro la brilo de la festoj kaj ekskurso, ŝis nun neatingita sukceso estas certigata. La programo estos precipe dediĉata al sifilo kaj ĝiaj rilatoj kun la diversaj medicinaj specialaĵoj, kaj kunigos nomojn de D-roj Gougerot (Paris), Nicolas (Lyon), Truffi (Padoue), Karl Marcus (Stockholm), J. Barge (Leyde), Spillmann (Nancy), Portmann (Bordeaux), Ravaut, Terrien, Couvelaire, Babonneix, Milian, Noël Fiessinger, Levaditi, Marcel Pinard, Lian, Guy Laroche, Ameuille, Louste (Paris), F. Bauer (Davos), Bessemans (Gand), Yernaux (Louvain), Dautrebande (Liège), Lespinne, Dekeyser, Van Lint, B. Dujardin, R. Bernard, F. Vanden Branden (Bruxelles), Dumont (Kongolando).

La solena malfermo, honorata de la ĉesto de Ŝia Reĝina Moŝto, okazos sabaton 24an de junio. S-ro Sarolea, profesoro ĉe la Edimburga Universitato, faros la inaŭguracian prelegon.

La kvina tago estos dediĉata al ekskurso al Ostendo, kie okazos la oficiala malfermo de la termalaco, kaj kie belegan akcepton ĝuos la kongresanoj.

La kotizo (100 belgaj frankoj) enhavas enskribon, kaj inviton al ĉiuj festoj (escepte la festenon, aparte mendotan), kaj al la Ostend'a tago (speciala vagonaro, lunĉo, marekskurso, temanĝo, festeno kaj koncerto en la festejo). Por informoj kaj enskriboj, sin turni al D-ro Beckers, ĝenerala-sekretario, 141, rue Belliard, Bruxelles (Belgiujo).

.....

BIBLIOGRAFIO.

I. — Librojn kaj presaĵojn por recenzo oni bonvolu sendi duekzemplere al D-ro KEMPENEERS, 19, avenue Montjoie, UCCLE-3, Belgujo.

II. — Ĉiujn librojn kaj gazetojn nacilingvajn aŭ esperantlingvajn mendu pere de nia libreja fako.

III. — Se vi mendos senpere de la eldonisto libron aŭ gazeton cititan en I. M. R., bonvolu citi nian gazeton!

IV. — Kolegoj pretaj kunlabori en bibliografia fako bonvolu interrilatiĝi kun la administracio, kaj indiki fakon deziratan kaj lingvojn legatajn.

1) MEDICINO.

A) Libroj.

GERMANLINGVE.

— *Anleitung zur fröheitigen Erkennung der Krebskrankheit*, de BEST, FROMME, PAYR, ROSTOSKI, SAUPE, SCHMORL, TONNDORF, WARNEKROS. VIII kaj 134 paĝoj. 22 × 14,1 cm. Eldonita de S. HIRZEL (Leipzig).

UKRAJNLINGVE.

— *Kondiĉaj refleksoj*, 234 paĝa libro, kun artikoloj de diversaj aŭtoroj, eldonitaj de P-ro D-ro VOLBORTH. (Ukrajna ŝtata medicina presoficejo, Ĥarkov 1932.)

B) Gazetoj.

ANGLALINGVE.

— *Medical Times and Long Island Medical Journal* (95, Nassau St., New-York, N.-Y.) vol. LXI, n-roj 1-4.

FLANDRALINGVE.

— *Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift* (8, Louizastraat, Antwerpen), 14a jaro, n-roj 1-11.

FRANCLINGVE.

— *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles, Belgujo), 13a jaro, n-roj 1-23.

— *Revue Belge des Sciences Médicales* (2, rue du Manège, Louvain, Belgujo). La 1a n-ro de la Va vol. enhavas nekrologon de P-ro A. Lemaire kaj diversajn artikolojn pri B.C.G. vakcinado.

— *Revue française de Phoniatrie*, eldonita de J. Tarneaud, Ĝenerala-Sekretario de la franca Societo de Foniatrio. La gazeto publikigas la verkojn prezentitajn al la Societo, kiu havas kiel celon, la sciencan kaj praktikan studon de la demandoj rilatantaj la fiziologion kaj la patologion de la voĉo kaj parolo. Adreso : 27, avenue de la Grande-Armée, Paris. La 1a numero de la 1a jaro, kiun ni ĵus ricevis enhavas la statuton kaj la historion de la Societo, la liston de ĝiaj membroj kaj diversaj originalaj artikoloj; inter ili, de D-ro de Parrel, interesan leksikon de foniatrio, kun utilaj difinoj. Estus bone, que tiun vortareton iu el niaj kolegoj traduku esperantlingve por publikigo en I. M. R.

FONDO DE INTERNACIA KOMITATO POR ESPLORADO KAJ KONTRAŬBATALADO DE CIRKULADAJ PERTURBOJ

Unua regula kunveno en Bad Nauheim.

Okaze de la 6-a kunveno de la germana societo por cirkuladesploro en Würzburg (Bavarlando), la komitato, starigita en Aprilo 1931 en la Kerkhoff-Instituto de Bad-Nauheim, celinta la esplorado kaj kontraŭbataladon de cirkuladaj perturboj, estas fondita kiel *Internacia Komitato por esplorado kaj kontraŭbatalado de cirkuladaj perturboj*.

La fondiĝo, en kiu aperis ĉirkaŭe 60 delegitoj de la en- kaj eksterlando, inter ili ankaŭ Ameriko, estis okazigata de la prezidanto de la regna higienoficejo, S-ro sekr. regist. konsilisto D-ro Hamel. Laŭ propono de la Amerikanoj por la unua regula kunsido de la komitato — je la fino de junio 1934 — estis destinata la Kerkhoff-instituto en Bad Nauheim. Al la amerika komitato oni prezentos la honoran prezidantecon de ĉi tiu unua kunsido.

Tiu internacia scienca kunlaborado estas plej grava por la batalo kontraŭ la cirkuladaj malsanaj de jaro al jaro pli ruinigaj.

Trad. BLUTH (Bad Neuenahr).

.....

BRUSELAJ MEDICINAJ TAGOJ

La XIIIa kunsido de la bruselaj medicinaj tagoj okazos de la 24a ĝis la 28a de junio 1933, kun la alta patronado de Iliaj Gereĝaj Moŝtoj; P-ro Valère COCQ prezidos. Pro la granda valoro de la scienca kunlaborantaro kaj pro la brilo de la festoj kaj ekskurso, ŝis nun neatingita sukceso estas certigata. La programo estos precipe dediĉata al sifilo kaj ĝiaj rilatoj kun la diversaj medicinaj specialaĵoj, kaj kunigos nomojn de D-roj Gougerot (Paris), Nicolas (Lyon), Truffi (Padoue), Karl Marcus (Stockholm), J. Barge (Leyde), Spillmann (Nancy), Portmann (Bordeaux), Ravaut, Terrien, Couvelaire, Babonneix, Milian, Noël Fiessinger, Levaditi, Marcel Pinard, Lian, Guy Laroche, Ameuille, Louste (Paris), F. Bauer (Davos), Bessemans (Gand), Yernaux (Louvain), Dautrebande (Liège), Lespinne, Dekeyser, Van Lint, B. Dujardin, R. Bernard, F. Vanden Branden (Bruxelles), Dumont (Kongolando).

La solena malfermo, honorata de ŝia Reĝina Moŝto, okazos sabaton 24an de junio. S-ro Sarolea, profesoro ĉe la Edimburga Universitato, faros la inaŭguracian prelegon.

La kvina tago estos dediĉata al ekskurso al Ostendo, kie okazos la oficiala malfermo de la termpalaco, kaj kie belegan akcepton ĝuos la kongresanoj.

La kotizo (100 belgaj frankoj) enhavas enskribon, kaj inviton al ĉiuj festoj (escepte la festenon, aparte mendotan), kaj al la Ostend'a tago (speciala vagonaro, lunĉo, marekskurso, temanĝo, festeno kaj koncerto en la festejo). Por informoj kaj enskriboj, sin turni al D-ro Beckers, ĝenerala-sekretario, 141, rue Belliard, Bruxelles (Belgujo).

.....

BIBLIOGRAFIO.

I. — Librojn kaj presaĵojn por recenzo oni bonvolu sendi duekzemplere al D-ro KEMPENEERS, 19, avenue Montjoie, UCCLE-3, Belgujo.

II. — Ĉiujn librojn kaj gazetojn nacilingvajn aŭ esperantlingvajn mendu pere de nia libreja fako.

III. — Se vi mendos senpere de la eldonisto libron aŭ gazeton cititan en I. M. R., bonvolu citi nian gazeton!

IV. — Kolegoj pretaj kunlabori en bibliografia fako bonvolu interrilatiĝi kun la administracio, kaj indiki fakon deziratan kaj lingvojn legatajn.

1) MEDICINO.

A) Libroj.

GERMANLINGVE.

— *Anleitung zur fröheitigen Erkennung der Krebskrankheit*, de BEST, FROMME, PAYR, ROSTOSKI, SAUPE, SCHMORL, TONNDORF, WARNEKROS. VIII kaj 134 paĝoj. 22 × 14,1 cm. Eldonita de S. HIRZEL (Leipzig).

UKRAJNLINGVE.

— *Kondiĉaj refleksoj*, 234 paĝa libro, kun artikoloj de diversaj aŭtoroj, eldonitaj de P-ro D-ro VOLBORTH. (Ukrajna ŝtata medicina presoficejo, Ĥarkov 1932.)

B) Gazetoj.

ANGLALINGVE.

— *Medical Times and Long Island Medical Journal* (95, Nassau St., New-York, N.-Y.) vol. LXI, n-roj 1-4.

FLANDRALINGVE.

— *Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift* (8, Louizastraat, Antwerpen), 14a jaro, n-roj 1-11.

FRANCLINGVE.

— *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles, Belgujo), 13a jaro, n-roj 1-23.

— *Revue Belge des Sciences Médicales* (2, rue du Manège, Louvain, Belgujo). La 1a n-ro de la Va vol. enhavas nekrologon de P-ro A. Lemaire kaj diversajn artikolojn pri B.C.G. vakcinado.

— *Revue française de Phoniatrie*, eldonita de J. Tarneaud, Ĝenerala-Sekretario de la franca Societo de Foniatrio. La gazeto publikigas la verkojn prezentitajn al la Societo, kiu havas kiel celon, la sciencan kaj praktikan studon de la demandoj rilatantaj la fiziologion kaj la patologion de la voĉo kaj parolo. Adreso : 27, avenue de la Grande-Armée, Paris. La 1a numero de la 1a jaro, kiun ni ĵus ricevis enhavas la statuton kaj la historion de la Societo, la liston de ĝiaj membroj kaj diversaj originalaj artikoloj; inter ili, de D-ro de Parrel, interesan leksikon de foniatrio, kun utilaj difinoj. Estus bone, ke tiun vortareton iu el niaj kolegoj traduku esperantlingve por publikigo en I. M. R.

HISPANLINGVE.

— *El Siglo Medico* (Serrano, 58, Madrid, Hispanujo), LXXXa jaro, n-roj 4127-4137.

PORTUGALLINGVE.

— *Revista da Associação Paulista de Medicina* (Caixa Postal 2103, Sao Paulo, Brazilo), vol. 2, n-ro 1.

2) ALIAJ FAKOJ.

Gazetoj.

NACILINGVE kaj ESPERANTLINGVE.

— *Arbeiter-Esperantisten* (Postboks 944, Oslo), 9a jaro, n-roj 1-2.

— *Argentina Esperantisto* (C. Pellegrini 238, Buenos-Ayres), 6a jaro, n-ro 80-81 (kun afabla kaj favora recenzo pri Teknika Vortaro).

— *Flandra Esperantisto* (Julius de Geyterstraat, 131¹, Antwerpen, Belgujo), 4a jaro, n-ro 10.

— *Laborista Esperantisto* (Middenweg, 226, Amsterdam O), 5a jaro, n-roj 1-7.

— *La Revuo Orienta* (Hongoo-Motomači 1, Tokio, Japanujo), 14a jaro, n-roj 1-3.

— *Informoj de Esperanto-Asocio de Estonio* (Postkast 6, Tallinn), n-ro 133 (3).

— *L'Esperanto* (Via G. Casalis, 25, Torino, Italujo), XXa jaro, n-roj 4-5. (Kun itallingva sufiĉe longa noto pri I.M.R. kaj T.E.K.A., aspektanta tute favora.)

— *Svenska Esperanto-Tidningen, La Espero* (Biblioteksgatan, 30, Stockholm), 21a jaro, n-ro 3.

— *The British Esperantist* (142, High Holborn, London, W.C.I., Anglujo), Vol. XXIX, n-ro 336.

.....

MEDICINAJ KONGRESOJ.

La VIa Internacia Fizioterapia Kongreso okazos verŝajne en Praha (Ĉeĥoslovakujo) dum venonta septembro. Ĉar la Estraro de la Internacia Societo, en kiu estas nia honora protektanto P-ro I. Gunzburg, tre favoras Esperanton, ni petas ĉiujn niajn amikojn pripensi la eblecon amase aliĝi al la Kongreso kaj fari en ĝi esperantistan sektion. La loko kie okazos la Kongreso ŝajnas tute taŭga por tia kunveno.

Esperantistoj! Memoru ke la Ia Internacia fizioterapia Kongreso, okazinta en Lieĝo (Belgujo) en 1905 akceptis Esperanton kiel oficialan lingvon. Montru nian standardon tie, kie ĝi estos bonvenata!


.....

Patentex

D.R.P.

Vagina antisepsilo, profilaksa

De pli ol 25 jaroj elprovita en la manoj
de la kuracistoj. — Fidinda en la agado,
simpla en la uzo, senlime tolerebla. —



Patentex-Fabrik. Frankfurt A. M. (GERMANUJO)

ARCTUVAN

Iaŭ D-ro E. WOSSIDLO

(Konsisto: Ekstr. uv. ursl. kaj lign. sant., Fen. sali., heksamet. tetram.)

Nova kuracilo kontraŭ ĉiuj akutaj kaj kronik. pielitoj kaj veziko-pielitoj,
ĉiuj formoj de vezikaj malsanoj, de malsanoj de la vezikkolo, gonoreo kaj
ties komplikaĵoj.



Literaturo kaj ekzemplaroj de **D-ro Otto Krause, Magdeburg, Germanujo.**

EINFÜHRUNG IN DIE RÖNTGENOLOGIE

Ein Lehrbuch für Aerzte und Studierende

Von Prof. Dr. med. **G. F. Haenisch**, leitender Oberarzt am allgem. Krankenhaus Barmbeck, Hamburg, und Prof. Dr. med. **H. Holthusen**, leitender Oberarzt am allgem. Krankenhaus, St. Georg, Hamburg. Mit einem physikalisch-techn. Beitrag von Priv.-Doz. Dr. **A. Liechti**, Oberarzt am Inselspital, Bern. 1933, Lon.-8°, XV, 359 Seiten. Mit 299 Abbild. und Skizzen, M. 23.—, in Ganzleinen gebunden M. 25.—.

Mit dieser Einführung liegt die erste elementare Darstellung der gesamten medizinischen Röntgenkunde vor, die dem Arzt oder Studenten die Grundbegriffe der Röntgenologie darlegt und ihm eine klare Uebersicht über Wege und Leistungsfähigkeit des Röntgenverfahrens gibt.

GEORG THIEME / VERLAG / LEIPZIG

PRAKTISCHE DIÄTETIK

mit über 500 Kochrezepten für Diätetische Behandlung
für Aerzte und Patienten von **Geh. Hofrat Dr. L. Roemheld**, Sanatorium Schloss Hornegg a. N. Dritte, erweiterte u. Neubearb. Auflage des "Praktischen diätetischen Kochbuchs" von Dr. **Curt Pariser**. 1933. 8°. 216 Seiten. In Ganzleinen gebunden M. 5.90.

INHALT: I. Teil : **Einleitung.** — II. Teil : **Diätetische Grundzüge :** I. Diät bei Magenkrankheiten ; II. Diät bei chronischen Darmkatarrhen mit anhaltenden Diarrhöen ; III. Diät bei chronischer Darmträgheit ; IV. Diät bei Magen-, Darm-Gesunden, Nervös Labilen und Rheumatikern ; Anhang ; Diät bei Herzkranken und Gichtikern ; V. Kochsalzfreie, eiweissarme Krankenkost, vegetarische Diät und Rohkost ; VI. Diät bei Mastkuren ; VII. Diät bei Fettsucht ; VIII. Diät bei Diabetes ; IX. Leberdiät. — III. Teil : **Rezeptteil.**

Fischers Medizinische Buchhandlung / Leipzig

Imp. Médicale et Scientifique (S. A.), 34, rue Botanique, Brux. Tél. : 17.16.49

